

金匱要略

金匱要畧

南陽張仲景纂

錢塘後裔志聰隱庵詩

朱長春永年

同學沈泰亨文存合參

倪朱龍沖之

中風歷節病脈證第五

夫風之爲病。當半身不遂。或但臂不遂者。此爲痺。  
脈微而數。中風使然。

原證乃留  
 通于筋骨  
 皮膚之間  
 久而不去  
 內合于筋  
 府與中風  
 之病氣不  
 同也

此首論中風之證與痺證不同也。經曰：病在陽者名曰風，病在陰者名曰痺。風為陽邪，始傷陽氣，虛邪偏客於身半，故當半身不遂。若但臂不遂者，乃邪傷脈絡筋骨，此為痺也。微為氣虛，數則為熱，脈微而數，此風邪傷氣而迫於所生，致使經脈微數者，風中陽氣之使然也。本經凡邪在氣分者多不言脈，此章中風與痺證，單有氣脈之分，故曰脈微而數，中風使然也。寸口脈浮而緊，緊則為寒，浮則為虛，寒虛相搏，邪

首章論風邪始傷皮膚氣分此後論皮膚之邪而轉入于血脈藏府本經曰四肢九竅血脈相傳邪基不通為外皮膏所中也蓋邪之中入始于皮膚以及于絡脈經絡

在皮膚。浮者血虛。絡脈空虛。賊邪不瀉。或在或右。邪氣反緩。正氣即急。正氣引邪。峭僻不遂。邪在於絡。肌膚不仁。邪在於經。即重不勝。邪入於腑。即不識人。邪入於臟。舌即難言。口吐涎。

此言風邪之善行數變。匪則傷氣而更入於經。絡臟腑也。經曰風之傷人也。或為寒熱。或為熱中。或為寒中。或為厲風。或為偏枯。風氣藏於皮膚之間。內不得通。外不得洩。風者善行而數變。

寒邪則內  
入于募府

矣

元陽之氣

主于腎藏

系則下焦

寒生氣索

則虛浮

針矣

浮者血虛

者字當石

眼

下章云衛  
寢為非風

腠理開則洒然寒。閉則熱而悶。各曰寒熱。寸為  
 陽。寸口脈浮。風邪干氣也。氣傷則虛。故浮則為  
 虛。陽氣虛則腠理開而洒然寒。寒則脈緊也。寒  
 虛相搏。乃邪在於皮膚。氣分之間。邪在氣則脈  
 浮。邪有餘於氣。則榮血不足。而絡脈空虛。故浮  
 者血虛也。夫風為陽邪。藉陰液以對待。絡脈空  
 虛。則賊邪不能瀉出矣。或客於左。或客於右。邪  
 氣反緩。正氣即急。蓋風傷氣。氣傷則弛而緩。故

邪中之半身。經脈肌肉。反懈弛而緩。邪緩則正  
卽急矣。正氣急而引邪之緩。則爲口眼喎斜。半  
身不遂矣。絡淺而在皮膚。故邪在於絡。則肌膚  
不仁。經深而濡利筋骨關節。故邪在於經。卽體  
重不勝也。六腑不和。則九竅爲之不利。故邪入  
於腑而卽不識人也。夫心主言。而開竅於舌。心  
者。生之本。神之變也。爲十二官之主宰。邪入於  
臟。則神志傷。而舌卽難言矣。口者。脾之竅。脾爲

中央土以溉四臟邪平臟氣則脾氣傷而口流涎矣。

經曰胃脈沉鼓濇胃外鼓大心脈小堅惡背臑偏枯男子發左女子發右不瘖舌轉可治二十日起其從者瘖三歲起年不滿二十者三歲死蓋胃與脾爲表裏陰陽異位更實更虛更逆更從或從內或從外是故胃陽虛則內從於脾內從於脾則脾之陰盛故胃脈沉鼓濇也濇爲多血少氣胃之陽盛則脾之陰虛虛則不得與陽主內反從其胃越出於部分之外故胃脈鼓大於臂外也夫爲多氣少血心者元陽君主宅之生血主脈因元陽不足陰寒乘之故心脈小堅惡小者陽不足也堅惡者陰寒之邪也夫如是心胃之三等脈凡有其一卽爲偏枯者何也蓋

上唇論夫  
氣元真不  
足則邪中  
于皮膚而  
謂于藏府  
此章論榮  
衛不足而  
止為隱疹  
短氣蓋榮  
衛乃中焦

心是天真神機開發之本。胃是穀氣充大真氣之標。標本相得。則胸膈間之壅滯氣海。所留宗氣盈溢。分布四臟。三焦上下中外。無不周遍。若標本相失。則不能致其氣於氣海。而宗氣散矣。故分布不周於經脈。則偏枯。不周於五臟。則痞。此偏枯難言流涎之病因也。

寸口脈遲而緩。遲則為寒。緩則為虛。榮緩則為亡血。衛緩則為中風。邪氣中經。則身痒而癢疹。心氣不足。邪氣入中。則胸滿而短氣。

此論風邪之傷榮衛也。經云。虛邪偏客於身半。其人深。內居榮衛。榮衛稍衰。則真氣去。邪氣獨



辨生虛則  
 同和內陷  
 留中而轉  
 寸心氣不  
 及藏府當  
 知中風則  
 同而為病  
 則別  
 榮衛內陷  
 上于于心  
 皆傷寒論  
 宗印辨脈  
 篇  
 榮衛生于  
 中焦水穀  
 之精中焦

留發為偏枯。其邪氣淺者。脈偏痛。夫榮衛者。精  
 氣也。皆中焦水穀所生之氣。清者注陰而為榮。  
 濁者注陽而為衛。是以榮衛氣傷而為寒。為虛  
 矣。血生於榮。氣榮緩則榮氣傷而不能生血。是  
 為亡血也。衛緩則衛為風。邪所干而衛虛。故為  
 中風也。邪氣中經。則榮血傷而不得汗解。故身  
 體為痒。邪氣傷血。則血熱而成癰疹也。心主血  
 脈。心氣不足。則邪氣入中。邪入於心。主官城之

然則脈遲

根本不足

則非筋虛

緩矣

前章論氣

血虛而為

中風此論

筋骨弱而

為歷節

此章論外

因之黃汗

然內外二

因皆涉筋

骨疎泄之

所致

中則腫中宗氣受傷故胸滿而短氣也。以上三節論中

風故無痛證與後章之歷節風各有分別。

寸口脈沉而弱沉即主骨弱即主筋沉即為腎弱

即為肝汗出入水中如水傷心歷節黃汗出故白

歷節。

此論筋骨疎而黃汗歷節出也夫腎主骨肝主

筋諸筋皆屬於節諸骨皆絡於筋寸口脈沉而

弱即筋骨疎而肝腎虛矣汗出入水中浴則為

黃汗如水傷心。卽爲歷節。心者神之主也。節之交三百六十五會。神氣之所遊行。水氣傷心。則神氣遊越。汗隨氣出。故爲歷節黃汗也。歷節者到。蓋隨神氣而行。故無處不到。是以隨心氣而出者爲歷節黃汗。否則止黃汗而非歷節也。跌陽脈浮而滑。滑則穀氣實。浮則汗自出。

此承上章而言。外因之水而爲黃汗者。由中焦蒸胃之爲黃也。穀氣者。胃氣也。如跌陽之脈浮而滑。滑則穀氣實。浮則汗自出。蓋言正氣實而

黃汗證治  
 列于水證  
 篇中本篇  
 止論歷節  
 故編目不  
 言黃汗也  
 又重別黃  
 汗二條者  
 蓋言水傷  
 心則為歷  
 節黃汗風  
 傷野則為

所受之水。卽隨氣出而為汗也。夫汗出入水中

成黃汗耶。故隨接此章以言殺氣實者。水卽隨

少陰脈浮而弱。弱則血不足。浮則為風。風血相搏。

卽疼痛如掣。

此論血弱而風傷於骨也。腎主液而化血。少陰

脈弱則血不足矣。風為陽邪。血為陰液。陰陽邪

正之氣交相對待。血不足則風淫矣。陽熱之邪

與弱血相搏。卽疼痛如掣。此蓋言傷於水者。則

振風如風  
深並傷則  
然歷節痛  
風蓋借黃  
汗以論歷  
節也

為歷節而不疼。傷於風者則疼痛而不歷節。如

風濕兩感則為歷節痛矣。

按中風之無痛證者始傷表氣以及於絡

脈由經絡而內于臟腑。此風邪直搏於陰。故疼痛如掣。

盛人脈濇小短氣自汗出歷節疼不可屈伸。此皆

飲酒汗出當風所致。

此總論風濕之為歷節疼痛也。飲酒則濕傷於

內。汗出當風又汗濕從風而內入矣。風濕相傳

是以歷節疼痛不可屈伸也。盛人體厚之人也。

脉濇小者。經氣不足也。體厚則氣厚。經氣不足。則血少。氣厚血少。則當無汗矣。短氣而汗出者。蓋言汗不出於榮液肌腠。乃歷節而出者也。此因受風濕。有傷筋骨。故不可屈伸。此風濕所感。筋骨並傷者。爲歷節痛風也。

諸肢節疼痛。身體尪羸。腳腫如脫。頭眩短氣。溫溫欲吐。桂枝芍藥知母湯主之。

桂枝芍藥知母湯方



若復從內  
而歷節於  
外與外因  
濕流閉  
節者不同  
也  
寒濕上乘  
則正胸上  
有熱故溫  
溫欲吐而  
不吐也

肢節疼痛。身體曲僂而羸弱也。脚腫如脫者。濕  
氣下流也。頭眩短氣者。風氣上淫也。風熱之陽  
邪在上。寒濕之陰邪在下。寒熱交錯於中。是以  
溫溫欲吐也。桂枝主行氣以驅風。芍藥養經榮  
而勝濕。然治風又先養血。行濕當宜助陽。知母  
資肺金以行榮衛陰陽。制風木而通調水道。是  
以三藥爲主劑也。配附子以溫散下焦之寒水。  
佐白朮助脾土以制勝其水邪。防風驅風而勝



歷節黃汗  
歷節痛風  
兩證名別

濕麻黃通氣以宣陽。生薑甘草宣助陽明之氣。以祛風濕之邪。蓋陽明主秋金而屬土也。

味酸則傷筋。筋傷則緩。名曰泄。鹹則傷骨。骨傷則痿。名曰枯。枯泄相搏。名曰斷泄。榮氣不通。衛不獨行。榮衛俱微。三焦無所御。四屬斷絕。身體羸瘦。獨足腫大。黃汗出。脛冷。假令發熱。便爲歷節也。

此論內因之黃汗而爲歷節也。味過於酸則傷筋。筋傷則弛而緩。名曰泄。謂其不能束骨而踈。

筋竹斷泄  
則榮氣不  
通榮氣不  
通則水液  
不入於經  
而化血反  
留聚為黃  
汗矣

泄也。味過於鹹則傷骨。骨傷則痿。名曰枯。謂其  
骨無脂膏而如木之枯委也。枯泄相搏。名曰斷。  
泄謂筋骨之氣不能連續而怠緩也。骨即為腎。  
筋即為肝。腎主液而肝主血。肝腎氣傷則榮血  
之氣不流通於經脈矣。榮衛不能相將則三焦  
無所依仰而御用也。四屬四肢也。手足陰陽之  
經氣不能循環而斷絕矣。榮氣者精氣之獨行  
於經以奉生身莫貴於此。衛氣者所以溫分肉

經曰水入於經而血乃成榮衛不行則水液反留聚河爲黃汗

充皮膚肥腠理而司開合榮衛俱微是以身體羸瘦也。腎主液入心化赤而爲血。衛出下焦衛不獨行則水臟之液不能上輸故獨起腫大榮出中焦榮氣不通則津液不行留聚而爲黃汗也。君火之氣不交於下故脛冷假令發熱乃心氣發越汗隨神氣而出於節間便爲歷節也。病歷節不可屈伸疼痛者烏頭湯主之。

烏頭湯方

麻黃 三兩

芍藥 三兩

黃耆 三兩

甘草 三兩

川烏 五枚咬咀以蜜二升煎取一升即出烏頭

右五味咬咀四味以水三升煮取一升去滓

內蜜煎中更煎之服七合不知盡服之

此言歷節痛風者又宜烏頭湯主之蓋濕留於內因心氣而始為歷節兼之風濕相搏乃成歷節痛風然濕隨心神之氣歷節者濕傷心氣之所致也故宜用烏頭以助心氣烏乃太陽之精

心為陽中  
此太陽

其性火熱。其形象心。用五枚蜜煎者。化土氣也。  
蓋因土濕之氣傷心。故復助心火之氣以化土。  
麻黃配黃耆以宣通衛氣。甘草助芍藥以資益。  
經榮心氣盛而土氣化。榮衛行而風濕除。

血痺虛勞病脈證第六

夫肌膚盛者氣聚於外，出故借尊榮人以言血痺之證多屬肌膚盛者得之。

經言血凝于膚者為痺，血行而不得反其空故也。

問曰：血痺痺從何得之？師曰：夫尊榮人骨弱肌膚盛，重困疲勞，汗出臥不時動，柱加被微風，遂得之。但以脈自微，澹在寸口關上，小緊，宜針引陽氣，令脈和緊去則愈。

痺者閉也。血痺者邪傷血而為痺也。夫尊榮人形樂而志苦，志苦則骨弱，形樂則肌膚盛，故曰形樂志苦，病生於脈。重困疲勞，則陽氣張而汗

傷則血凝  
于筋脈氣  
外而不伸  
反于徑隨

凡盛人者  
購蓋氣不  
得出於陽  
而留於陰  
久故也詳  
蓋經

大風則傷  
氣微風故  
傷血

出矣人臥則血歸於肝臥而不時動搖則血不  
內藏而又散於外矣寐則衛入於陰陽愈虛而  
不能為陰之守加被微風血遂得之而成痺矣  
夫寸為陽而主氣尺為陰而主血微為氣虛潛  
主少氣蓋肌膚盛則分肉不解氣行遲而留於  
陰故但以脈自微濇在寸口蓋言自之氣自虛  
於表以致邪傷血而為痺也風為陽邪傷於陰  
血陰陽相搏其脈則緊傷於微風故小緊也雖

傷於陰而在形身之外。故見於關而不及尺也。宜針引陽氣以外出。陽氣外出則脈自和平。陰陽和平而緊自去矣。夫氣爲陽。精血爲陰。陰陽之要。陽密乃固。氣不外出則風傷血而爲痺。煩勞而陽氣張則精絕於裏。是以血痺虛勞。彙成一章者。重陽氣之外固也。

血痺陰陽俱微。寸口關上微。尺中小緊。外證身體不仁。如風痺狀。黃者桂枝五物湯主之。



黃耆桂枝五物湯方

黃耆 三兩

桂枝 三兩  
去皮

芍藥 三兩

生薑 三兩  
切

大棗 十二  
枚 劈

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服。

一升。此資補榮衛氣血之劑。五味各為所主。故曰五物湯。

此復論氣血兩虛而成血痺也。大氣為陽。雖為

陰之外。固然陰中有陽。而陰氣亦能以禦邪。故

口表氣微虛。裏氣不守。而使邪入於陰也。陰陽

論受病  
之因此論  
為病之脈  
證而立致  
方之方

補筋血故  
曰小紫

俱微者。氣血兩虛也。關者。陽之盡。陰之表也。寸口關上微者。表氣虛而陰氣亦微也。尺中小紫者。邪入於陰也。榮衛不行。則肌膚不仁。而有如風痺之狀也。黃者。桂枝五物湯主之。用黃者。以補衛。桂枝助陽氣。芍藥養陰榮。夫氣行肌膚。血行脈中。足太陰之氣主肌。脾故用大棗以補脾。足陽明之氣主經絡。故用生薑以宣胃榮衛氣。血充行。則陰分之陽邪自解。五味各有所主。故

曰五物湯

夫男子平人脈大爲勞極虛亦爲勞

此首論虛勞之因與脈也。男子多煩勞而主陽。故曰男子平人無病之人也。經曰煩勞則張精絕。蓋陽氣者衛外而爲固者也。勞則陽氣外張。故脈見虛大之象。平人脈大知其爲勞傷也。極虛者精絕之脈也。經言強力舉重則傷腎。腎傷則精絕。故亦爲勞傷之所致也。

下章云夫失精家脈極虛芤遲

持重遠行  
汗出於腎  
汗乃腎之  
精液也

君子勞心  
小人勞力  
勞心傷心  
勞力傷腎

極者六極之所謂精極血極也蓋血生於精而榮於脈精絕則血極而脈虛也男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脈浮者裏虛也

此論勞心而傷其血也經云心之合脈也其榮色也又曰心者生之本神之變也其華在面其充在血脈是以面色薄者知爲勞傷其心血也血虛則不能濡潤經脈而主渴血不華色或因亡血之所致也悸動也心氣虛則悸裏氣虛則

百章論脈

此章論證

大雅在經

脈別有往

來之寒熱

此章首言

脈恐誤

脈之

脈故曰無

喘卒喘悸而脈浮者。知心氣之虛於裏也。心主血脈。

血虛則脈浮。上句以面色薄而主心氣之虛。

于外末句以喘悸脈浮而主心氣之虛于裏。

男子脈虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面色

白時日暝兼飢少腹滿。此為勞使之然。

此論煩勞而傷其陽氣也。脈虛沉弦者陽氣虛

而無浮鼓之象也。辨脈篇曰陽脈不足陰往乘

之則洒淅惡寒陰脈不足陽往乘之則發熱此

虛在氣而不在脈故無往來之寒熱也。膻中氣

考使之然  
 與中風使  
 然同同意  
 蓋言勞傷  
 其陽氣致  
 使脈虛沉  
 眩目瞤而  
 兼也

之海也。宗氣上出於喉，隴以司呼吸。中氣虛故  
 短氣。虛氣下陷，故裏急也。膀胱者，州都之官，氣  
 化則出，氣虛不化，故小便不利也。夫精明五色  
 者，氣之華也。面者，諸陽之會。陽氣傷，故面色白  
 也。陽氣盛則瞤目，陰氣盛則瞑目。陽虛故時目  
 瞑也。經曰：陽氣未盛於上，而脈滿滿則血見於  
 鼻，陽虛於上，故兼衄也。氣不化而小便不利，故  
 少腹滿也。此為煩勞傷其陽氣而使之然也。

勞之爲病其脈大手足煩春夏劇秋冬瘥陰寒精  
自出酸劑不能行。

此承上文之義而言陽爲陰之固也勞之爲病  
其脈大者勞傷其陽氣也手足爲諸陽之本陽  
氣傷故手足煩也陽氣者煩勞則張精絕辟積  
於夏使人煎厥蓋春夏之氣從內而外更煩勞  
而張洩之故春夏劇也秋冬之氣從外收藏於  
內故秋冬瘥也夫陰陽之要陽濟乃固陰平陽

秘精神乃治陰陽離決。精氣乃絕。陽氣張洩於外。則陰寒精自出矣。腎者精之處也。其充在骨。陰寒精自出。是以酸削不能行。

男子脈浮弱而澹爲無子。精氣清冷。

此論本氣之陰陽清冷也。夫陽生於陰坎中之滿也。浮爲陽。男子脈浮弱者。陽浮之氣虛也。澹爲精血少。浮弱而澹者。陽虛而精冷也。當爲無子。蓋因陽虛而精氣清冷故也。上章論煩勞而



論勞傷  
論本虛

虛其陽以致陰寒精出此論人之元陽素本虛薄以致精氣清冷二者所當審別者也

夫失精家少腹弦急陰頭寒自眩髮落脈極虛芤遲為清穀亡血失精脈得諸芤動微緊男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯主之

桂枝龍骨牡蠣湯方

桂枝 一兩

芍藥 一兩

甘草

二兩  
炙

生薑 一兩

大棗 十二  
枚

龍骨

二兩

牡蠣 三兩

右七味以水七升。煮取三升。分溫三服。

此總論失精之脈證。而爲救治之方焉。前五句  
槩論失精之證。脈極虛芤遲以下。分論煩勞精  
絕及素本虛冷之各有別也。少腹弦急者。下焦  
虛冷也。陰頭寒者。中焦寒而不得溫潤。宗筋也。  
精陽之氣上走於目而爲睛。精陽虛故目眩也。  
腎主藏精。其華在髮。精氣虛故髮落也。夫極虛

脈從陰而  
陽自下而  
上故當先  
從緊而論  
至芤

亦爲勞蓋煩勞而陽張於外以致精絕於內而  
脈極虛也血生於精精絕則血虛故主亡血而  
脈芤也夫陰中之生氣爲陽明釜底之燃陽張  
精絕則生氣衰微是以脈遲而清毅也此爲煩  
勞之所致也夫脈得芤動微緊者緊則名陰陰  
中之生氣虛而精氣清冷也生氣虛則陽氣微  
也陰寒之氣上與陽明相搏其脈則動不得生  
陽之氣則津液無所資生故脈芤也此生陽之

氣素本虛寒。男子屬陽。當主失精。女子屬陰。故主夢交也。脈極虛。北遲者。外所因也。北動微緊者。內所因也。然總屬陽虛失精。故並宜桂枝龍骨牡蠣湯。主之。夫精主藏於腎。而資生於中焦。水穀之精。是以中下二焦。交相須助者也。桂枝助下焦之氣。爲陽明釜底之燃。芍藥生胃腑之津。資腎臟所藏之本。甘草薑棗。宣助中焦之氣。以培生化之原。龍骨牡蠣。起亟陰中之陽。而固

凡言脈如  
此動微象  
如虛弱細  
微如沉小  
遲守不用  
而守者皆  
當一氣論

澁其精之亡失精液生而封藏固脈自平而病  
自解矣。

男子平人脈虛弱細微者善盜汗出也。

此論生氣微而衛氣虛也。夫腎主藏精爲生氣  
之原先天。之生氣上與陽明相合而後生此榮  
衛。故曰榮出中焦衛出下焦。夫男子屬陽當主  
陽盛平人無病之人也。男子平人而見虛弱細  
微之脈者蓋緣生氣微細而表氣弱虛日合則

虛寒論下

虛寒而元

氣虛此章

言中焦微

而耐氣弱

衛歸於陰而表愈虛不能為陰之固而善盜汗

出也此蓋言煩勞則張精絕精氣清冷則表氣

虛表裏陰陽相生而相固者也

此章復結前男子平人脈大為

勞極虛亦為勞男子脈浮弱而濇為無

子精氣清冷之義故復曰男子平人

人年五六十其病脈大者痺俠背行苦腸鳴馬刀

俠瘦者皆為勞得之

此論陽氣衰而邪客之也人年七八天癸竭精

少腎臟衰形體皆極矣其病脈大者陽氣虛而

陷脈則爲  
瘰留連肉  
膜則爲瘰

精氣絕也。陽氣者精則養神柔則養筋開閣不  
得寒氣從之。乃生大瘰。故病痺俠背行也。陷脈  
爲瘰。留連肉膜。故有馬刀俠瘦之疾矣。經云中  
氣不足者腸爲之苦鳴。此蓋因年衰而陽虛精  
弱更兼煩勞則張精絕寒邪乘虛從之。而得此  
疾也。

脈沈小遲名脫氣。其人疾行則喘噎。手足逆寒。腹  
滿甚。則澹泄。食不消化也。

生氣虛故  
手足逆寒  
寒輕於冷

此論生氣之原於下焦也。夫肺主氣而司呼吸，然生氣發原於下，故腎爲本，肺爲末。若其脈沈小遲，此生陽之本衰微，不能上交於肺，名脫氣也。其人疾行則喘喝者，上下呼吸之氣不相續也。手足受氣於胸中，中氣虛而手足逆寒也。腹滿，中焦之氣虛也。甚則溇泄而食不化者，虛寒而不能主化也。此因生氣之虛於下，以致中焦之腹胃，上焦之膈胸，氣虛脫也。

夫生氣虛，則脈遲，遲則氣微，而



脈從下而  
上山陰而  
陽試本經  
言脈從上  
而下論脈  
又當從下  
而上

脈小。遲小。則不能動。  
越於外而脈沈矣。

脈弦而大。弦則為減。大則為芤。減則為寒。芤則為  
虛。虛寒相搏。此名為革。婦人則半產漏下。男子則  
亡血失精。

此論陽減於外而不能為陰之守也。弦則為減  
者。陽氣減而不得鼓動其脈。故如弦之端直不  
移也。大則為芤者。浮大於外而內虛。如芤草之  
中空也。減則陽減而為寒。芤則內空而為虛。虛

上章言陽  
氣生十情  
水之中此  
復言精血  
藉陽氣之  
外固

寒相搏。此名為革。蓋外寒。鞭如皮革。內虛。而按

之如鼓。空虛。較之弦。則內空大。較之乳。則外有

力也。夫生氣之原者。腎與命門也。命門者。諸神

精所舍。原氣之所繫也。男子以藏精。女子以繫

胞。外弦。絀而內扎。虛陽不能為陰之固。是以婦

人。主半產漏下。男子則亡血失精。上章以生氣  
虛下。則為

脫氣。此章以陽絀  
於外。則為脫精。

虛勞裏急。悸衄。腹中痛。夢失精。四肢痠疼。手足煩

蒸咽乾。燥。小建中湯。主之。

小建中湯方

芍藥 六兩

桂枝 三兩 去皮

甘草 三兩 炙

生薑 三兩

大棗 十二枚

膠飴 一斤

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。內膠飴。更上微火。消解。溫服一升。日三服。

夫元真精氣。皆少陰腎臟之所主。然氣乃先天水中所生。而精又屬後天水穀之液。而藏於腎。

逐味入口  
津液各走  
其道腎為  
水臟受五

然之津液

而截之

所生之氣

謂之精先

天之所生

也水穀之

精液後天

之所生也

先天後天

百川資生

者也補先

天者宜醫

氣化補後

天者宜建

中湯

者也是以真元不足者宜腎氣丸以資下焦之  
 原如虛勞而失精者又宜補中焦精氣所生之  
 本也裏急者中氣虛也悸者膈中虛而心下動  
 也衄者氣虛而血苑於上也夢失精者精虛而  
 陰洩也四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥者中焦  
 之精液虛而不能輸布也蓋榮衛精液皆中焦  
 水穀之所資生若因勞傷而陽虛精絕者宜小  
 建中湯建立其中營以資補榮衛津液夫補氣

宜辛補精血。宜甘建中湯。甘辛之劑也。用芍藥以資津血。桂枝以助元陽。生薑大棗。宜補中焦之氣。配膠飴甘草。以資生其精液焉。

虛勞裏急。諸不足。黃耆建中湯主之。

黃耆建中湯方

黃耆 三兩

桂枝 三兩

芍藥 六兩

甘草 三兩

生薑 三兩

膠飴 一升

大棗 十二枚

右七味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。  
日三服。

此論衛氣虛而成諸不足者。宜黃耆建中湯主之。夫衛氣者。所以溫分肉。充皮膚。肥腠理。司開閣者也。氣虛而開閣不利。故裏急。肌肉不充。爲諸不足也。黃耆表黃。內白。皮肉柔綿。主補益衛氣。而肥肌肉。配小建中湯。以資生其榮。衛津液焉。蓋榮爲根。衛爲葉。是以補衛氣者。當先益其

榮

主補衛故以黃省命名。仍養榮。故配芍藥膠飴反重。而仍名建中湯也。

虛勞腰痛。少腹拘急。小便不利者。八味腎氣丸主

之。

八味腎氣丸方

乾地黄

八兩

薯蕷

四兩

山茱萸

四兩

澤瀉

三兩

茯苓

三兩

牡丹皮

三兩

桂枝

一兩

附子

一兩

右八味為末。煉蜜和丸。梧子大。酒下十五丸。

此章論精  
生於中  
氣之  
此章論  
精氣原干  
上焦對氣  
之本

加至二十五丸。日再服。

此論精陽之原本虛弱者。宜入味腎氣丸。主之。  
腰者腎之腑。腎氣虛。故腰痛。精氣寒。故少腹拘。  
急。氣虛不化。故小便不利也。夫天乙生水。故生  
之來。謂之精。火生於水坎中之生陽也。是以腎  
者精之處也。命門為生氣之原地。黃色玄汁厚。  
主補天乙之水。附子氣雄。性熱。能益真火之原。  
茯苓澤瀉。行精液以下藏。肉桂丹皮。助元陽而



上達山藥補中焦津液之所生。蒸黃固下。為精陽之漏洩。此補益先天真水真火之聖劑也。

虛勞諸不足。風氣百疾。薯蕷丸主之。

薯蕷丸方

薯蕷

三十分

當歸

桂枝

乾地黄

麴

豆黃卷

各分

甘草

二十分

芎藭

麥門冬

芍藥

白朮

杏仁

各六分

人參 七分

柴胡

桔梗

茯苓 各五分

阿膠 七分

乾薑 三分

白歛 二分

防風 六分

大棗 百枚  
為膏

右二十一味。末之。煉蜜和丸。如彈子大。空腹酒服一丸。一百丸為劑。

虛勞諸不足者。榮衛氣血。肌肉筋骨皆虛也。虛則生風。故曰風氣。風為百病之長。故曰風氣百疾也。是當補其正氣。使榮衛和諧。三焦通暢。正

補氣  
補血  
補中  
補下  
補氣  
補血  
補中  
補下

氣充而不足資矣。人參、白朮、茯苓、甘草、資補元

氣者也。當歸、地黃、芍藥、川芎、行養榮血者也。麥

冬、阿膠、杏仁、白欝、桔梗、清益上焦者也。薯蕷、乾

薑、白朮、防風、大棗、麴、溫補中焦者也。乾地黃、豆

黃卷、桂枝、柴胡、升助下焦者也。氣血充而三焦

通暢，人即安和矣。

虛勞虛煩不得眠，酸棗湯主之。

酸棗仁湯方

思即前男  
面色薄  
者之至治

酸棗仁 二升  
甘草 一兩  
知母 二兩

茯苓 二兩  
芎藭 二兩

右五味。以水八升。煮酸棗仁。得六升。內諸藥。煮取三升。分溫三服。

此勞傷其心血。以致虛煩不得眠也。酸棗仁。味甘氣平。開小色赤。其形象心。補心脾之藥也。茯苓保心靈。潛伏而不致於虛煩。知母滋水之源。以濟心火。甘草補土之氣。以實母虛。芎藭。臣補。

血行血而心主血也。

五勞虛極羸瘦。腹滿不能飲食。食傷憂傷。飲傷房室傷。饑傷勞傷。經絡榮衛氣傷。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。緩中補虛。大黃蠶虫丸主之。

大黃行中氣

大黃蠶虫丸方

大黃行有形之血。蠶虫行陰血之氣。故以二藥命名。

大黃 十分

黃芩 二兩

甘草 三兩

桃仁 一升

杏仁 一升

芍藥 四兩

乾地黄 十兩

乾漆 一兩

蠶虫 一升

水蛭 百枚

蟬蛸 一升

麤頭 半升

右十二味末之。煉蜜和丸。小豆大。酒飲服五  
丸。日三服。

此論虛勞而傷其榮衛。以致血積而成乾也。夫  
臟腑經絡。谿谷百骸。總屬一陰陽耳。榮衛陰陽  
二氣也。是以五勞七傷。虛極羸瘦。皆傷榮衛之  
所致。榮衛氣傷。則血不自行。而有乾血矣。血不  
能濡。故肌肉甲錯。目不得血。故兩目黯黑也。難

經緩留中  
固也九緩  
神補虛而  
兼行乾血  
者也

經云。損其肝者。緩其中。肝主血。血傷則損其肝。故宜緩中補虛。和緩其中。則榮衛自生。補其虛弱。則羸瘦自復。故宜大黃。蠶虫。九行。其乾血。推陳則新血自生。血生則榮衛氣復。用大黃。桃仁。乾漆。蠶虫。水蛭。蟻螬。麤虫。以破瘀。地黃。芍藥。以潤其乾燥。甘草。緩中。杏仁。利肺。葢肺者。主行榮衛。陰陽。肺氣利。則乾血去。而榮衛行。榮衛行。則肌肉充。而虛勞補矣。

肺痿肺癰咳嗽上氣病脈證第七

問曰。熱在上焦者。因咳爲肺痿。肺痿之病。何從得之。師曰。或從汗出。或從嘔吐。或從消渴。小便利數。或從便難。又被快藥下利。重亡津液。故得之。曰。寸口脈數。其人欬。口中反有濁唾涎沫者何。師曰。爲肺痿之病。若口中辟辟燥。欬卽胸中隱隱痛。脈反滑數。此爲肺癰。欬唾膿血。脈數虛者。爲肺痿。數實者。爲肺癰。

上節論病因。  
下節論病證。



此論內因之肺痿肺癰也。肺居高而屬金。如熱在上焦。則火熱燔金。欬則傷肺。致肺葉熱焦而成肺痿矣。然肺痿之病。蓋因重亡津液。以致上焦熱而爲欬。熱欬則肺傷矣。夫肺者土之子。水之母也。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。金水之津。中土之所生也。如汗出嘔吐。消渴便利。妄下。皆傷中胃。以亡津液。水穀之津。無從上輸。以致熱在

若陽相搏  
其脈則滑  
肺主氣脈  
不應滑故  
曰反

上焦因欬而為痿。此所得之因也。寸口主肺。數則為熱。欬則肺氣受傷。若其人反有濁唾涎沫者。此肺氣傷而不能通調水道。即有上輸之津。反從脾竅而出。此謂肺傷而成痿病也。又若口中辟辟燥。此熱甚而涎沫併竭。欬即胸中隱隱痛。脈反滑數。滑主有形。數則熱甚。此為肺痿。而當欬唾膿血也。痿癰皆主數熱。但無形而痿者。主脈虛。有形而成癰者。主脈實也。

外因之難  
辨若內因  
定熱數故  
因其脈何  
類

問曰病欬逆脈之何以知此為肺癰當有膿血吐  
之則死其脈何類師曰寸口脈微而數微則為風  
數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不  
入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍  
於肺其人則欬且乾喘滿咽燥不渴時唾濁沫時  
時振寒熱之所過血為之凝滯畜結癰膿吐如米  
粥始萌可救膿成則死

此論外因之肺癰也寸以候肺候表寸口脈微

熱盛則

氣虛故

寒

氣相搏

熱則

榮此氣

於邪迫

於經絡

故曰過

而數者。風則傷氣。故微則為風。風為陽邪。故數則為熱。氣虛則汗出。熱盛則惡寒。衛氣為陽。榮氣為陰。呼出為陽。吸入為陰。風中於衛。則陽氣外弛。故呼氣不入。熱過於榮。則榮氣內泣。故吸而不出也。夫出為陽。陽生於陰也。入為陰。陰生於陽也。此榮衛氣傷。故雖呼吸而無相生之出入也。風為陽邪而傷氣。故始傷皮毛。風氣相搏。則為數熱。熱則傷榮。故熱傷血脈也。皮毛者。肺

通字當以  
兼在經絡  
之內者

之合風邪不去。內舍於其合。故其人卽欬。肺主燥。金秋令。更傷於風。故口乾咽燥。氣傷故喘滿。熱不在經。故不渴也。肺氣傷而不能通調水道。故時唾濁沫。肺主周身之氣。故時時振寒。熱傷血脈。故熱之所過。則血爲之凝滯。經云。陽氣有餘。榮氣不行。乃發爲癰。陰陽不通。兩熱相搏。乃化爲膿。是以畜結而癰膿也。吐如米粥者。肺色白而肺臟將傷也。臟不可傷。是以始萌可救。膿

成則死。

此章作兩節看風傷皮毛。熱傷血脈。復提起講。

上氣面浮腫肩息。其脈浮大不治。又加利尤甚。

此論上氣之爲病也。夫肺主氣而發原於腎。故腎爲本。肺爲末。上氣者。氣惟上而不下。接於腎也。而浮腫者。虛氣上浮也。經曰。病在肺。俞在肩。肺氣不能下交。故惟上而肩爲之縱也。其脈更浮大。是氣惟上惟外。與根氣不相交接。根絕則莖葉枯矣。故爲不治之證。又下利者。腎氣不上。

交而反下洩。是上推上而下推下。上下相離之尤甚也。此言腎間動氣爲生氣之原。呼吸上下交相貫通。不可須臾離也。

上氣喘而躁者。屬肺脹。欲作風水。發汗則愈。

此論肺病於上。而根氣不能上通也。上氣喘而無息。肩之證者。是肺病而不能外洩也。躁者。腎病也。上氣不疎。則下氣過密。氣不通達。故躁而不安也。此屬肺脹。而不能通調其氣。欲作風水。

矣。蓋腎氣不能通洩於上。逆甚則傳之於子而爲風。腎爲水臟。氣不順行。則水亦妄逆。當發汗則愈。蓋肺主皮毛。外竅開而裏竅通。上竅踈而下氣暢矣。夫氣者人之本也。上章論氣絕於下者不治。此章論肺氣病於上者易愈。臨病之工標本虛實。可不詳審而細察焉。

肺痿。吐涎沫而不咳者。其人不渴。必遺尿。小便數。所以然者。以上虛不能制下故也。此爲肺中冷。必



眩。多涎唾。甘草乾薑湯以溫之。若服湯已渴者。屬消渴。

甘草乾薑湯方

甘草

炙 四兩

乾薑

炮 二兩

右咬咀。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

上二章論氣之所生在腎。此復論氣之所主在天。蓋所生者先天。所主者後天。上下先後。互相

經云上氣  
不足曰為  
之咳

生化者也。夫肺屬乾金而主天。師轄周身之氣。氣不施化。則小便為閉。為癥。氣不能制。則又為遺。為數。是先天生氣之原。又藉後天之氣化也。肺痿吐涎沫而不咳者。乃肺中因冷而痿。不能通調水液。非熱在上焦之為肺痿也。其人不渴者。又非重亡津液之所致也。此因肺中冷而氣虛。必致遺尿。而小便頻數。所以然者。以上虛不能制下故也。夫氣不能上充而必眩。不能下制。

而必遺不能中化而涎唾。上下中焦靡不由氣之响化也。宜甘草乾薑溫補其中。虛則補其母也。若服湯已渴者屬消渴。此又虛寒在下以致小便遺數。下章所謂男子消渴。腎氣丸主之是也。夫氣發原於下焦腎。生於中焦胃。主於上焦肺。是下而中。中而上者也。此章以上虛不能制下。是又上而下也。用甘草乾薑湯以補中焦。是又中而上。上而下也。如服湯已渴者屬消渴。此

又生氣之原本虛寒。不能上與陽明合化。雖溫補其中。反燥陽明而成渴。是又仍歸於下而中。中而上也。天地之氣。上下循環。周而復始。學者能法天之紀。用地之理。以治人。進乎技矣。

欬而上氣。喉中水雞聲。射干麻黃湯主之。

射干麻黃湯方

射干 十三枚

麻黃 四兩

生薑 四兩

細辛 三兩

紫菀 三兩

款冬花 三兩

五味子 半升

大棗 七枚

半夏 大者八枚洗

右九味。以水一斗二升。先煮麻黃兩沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。分溫三服。

經云。所謂嘔咳上氣喘者。陰氣在下。陽氣在上。諸陽氣浮。無所依從。故也。夫肺居高而主天。脾屬陰而主地。腎為水而居下。然在天之陽氣。又由地水之所生。是以地氣不能上。天氣不能下。宜越婢湯以發越之。蓋越婢者。越脾也。以發越其

建屬百而  
屬金

脾土之氣而上交也。如水陰之生氣不升者。宜  
小青龍湯以升起之。蓋龍爲東方之神。乃水中  
之生陽。而能上升者也。是以射干厚朴澤漆諸  
湯。皆以越婢青龍。隨脈證而加減者也。夫氣者。  
呼吸出入。上下循環。欬而上氣。是陽氣惟上。陰  
氣不升。上下天地之氣不交。金水子母之氣不  
續。喉乃呼吸之門。金水之聲。而反聞於喉也。用  
小青龍之麻黃細辛。半夏味子。升洩水中之生

陽用越婢湯之麻黃生薑大棗以發越其土氣  
冬至射于生能升一陽之氣赤黑相間曰紫能  
啓坎中之陽欬冬冬至而花不顧冰雪能發水  
中之生氣地水之陰氣上升則金天之上氣下  
降陰陽和而上下交則上氣平而欬自止矣  
欬逆上氣時時吐瀉但坐不得眠皂莢丸主之

皂莢丸方

皂莢

八兩刮去  
皮用酥炙

上章曰欬  
上氣此章  
曰欬逆上  
氣

右一味。末之。蜜丸。梧子大。以聚脣和湯服三  
九。日三。夜一服。

上章之所謂欬上氣者。陰氣在下。諸陽氣浮。無  
所依從故也。此章之所謂逆上氣者。是地水陰  
濁之氣上逆。清陽之氣不能下降故也。故所謂  
上氣者。在上之氣。惟上而為欬也。欬逆上氣者。  
濁陰之氣上逆。故時時吐濁。但坐而不得眠也。  
皂莢對皂。故又名烏犀。味辛。鹹溫。辛屬金。鹹入



腎。皂乃水色也。皂有不結實者。樹鑿一孔。入生鐵三五斤。泥封之。卽結莢。此木不受金刑。而轉以鐵爲生者。水之木也。故得母金之氣以爲生。木者。水之子也。能洩水氣之上逆。實則瀉其子也。木者。土之勝也。能制伐其阜氣。求其屬以衰之也。是以用皂莢而制洩其地水陰濁之氣。上逆也。實者。草木之秋成也。以在上稍秒之實。而得母金之氣。是又能導金氣以下交也。陰陽交

泰則清濁自分。用以爲丸者。宛在中央。而使上

下之相交也。

用棗膏通中土之逆。制水邪之上行。

欬而脈浮者。厚朴麻黃湯主之。

厚朴麻黃湯方

厚朴 五兩

麻黃 四兩

石膏 如雞子大

杏仁 半升

半夏 半升

乾薑 二兩

細辛 二兩

小麥 一升

五味子 半升

右九味。以水一斗二升。先煮小麥熟。去滓。內

諸藥煮取三升。溫服一升。日三服。

前二章論天地金水之氣逆而爲欬爲逆。此以下復論其地水之氣焉。夫下焦之水。雖受制於中土。然下焦之氣。又與陽明相合。戊癸合而後能化水穀之精。傷寒論曰。浮則胃氣強。胃強則水弱矣。水受其制勝。則生氣不升。生氣不升。則肺氣虛逆而爲欬矣。故用厚朴石膏以疎平散。阜之土氣。用小青龍之麻黃半夏。味子細辛乾

生氣不升  
則土氣反  
虛而肺氣  
虛寒矣

薑助生陽以上升。蓋小青龍者。啓發初陽之氣。而又兼制水邪。上逆之劑。是以用甘草配芍藥。甲巳合而化土。以制伐其水邪。用桂枝保心氣。以防奔豚之上逆。此因土氣太強。以致少陰之氣不升。非水邪兼逆之證。故減此三味。加杏子。以疎母金之氣。使下接子氣。以上交。用小麥。以通少陰之子氣。俾引母氣以外出。

麥乃肝之穀。莖直中通。得

陰中之陽而生。遇陽中之陰而先能通陰中之陽氣者也。腎乃肺之子。肝乃腎之子。

脈沉者。澤漆湯主之。

澤漆湯方

用行水氣故以澤漆命名

半夏

半升

紫參

五兩

澤漆

三斤以東流水五斗

煮取一斗五升

生薑

五兩

白朮

五兩

甘草

黃芩

人參

杜枝

各三兩

右九味。㕮咀。內澤漆汁中。煮取五升。溫服五

合。至夜盡。

喉中土  
所生脈沉  
故宜補上  
資脈

助火則土  
實

此水令強而土氣弱也。土氣不升。故脈沉。而沉則爲水也。土令不及。則水氣盛強。是以用奔豚湯之甘草黃芩。生薑桂枝半夏。以預防其水逆。半夏當夏半而生。能助火土之氣。甘草配人參。補益中土而資助脈。以外出。黃芩清肺氣。使制子氣之欲奔。桂枝輔心王。以防奔豚之水逆。而又能令母實也。生薑宣中焦之氣。紫參益火土之精。白前補肺氣。澤漆洩水邪。此益土資脈補。

是以黃芩  
沿奔豚

心肺之氣以預防水邪之劑也。蓋土令不及則

水欲上奔。土氣獨強則水中之生陽不發。故強

者抑之而弱者扶之也。

白前能制奔豚。蓋益肺之藥。皆能制子逆也。澤

漆乃大戟之苗。大能通洩水邪。用東流水者。取其水性之順流而下也。紫參一百五。烏花。五葩。

連蔓。狀如飛禽羽。紫乃火色。五為土數。參則資補中焦者也。

大逆上氣咽喉不利者。吐逆下氣。麥門冬湯主之。

麥門冬湯方

平。行肺氣。故以麥冬命名。

麥門冬 七升

半夏 一升

人參

甘草 各二兩

粳米 三合

人參 十二枚

右六味以水一斗二升。煮取六升。溫服一升。

日三。夜一服。

上章以土令不及。故預防水邪之上奔。此則土氣虛而水氣大逆於肺也。咽喉乃呼吸之門。腎氣大逆而肺氣惟上有土無下。是以咽喉不利也。當止其大逆。下其肺氣。高者抑之也。麥門冬性味甘涼。根鬚聯貫。能滋肺氣以下行。人參甘



虛則補其  
得土乃肺  
之母也

草。半夏。粳米。大棗。大補中土之氣。以制腎氣之

上逆。益肺金之母。助肺氣以下交。不致因虛而

上氣也。腎氣凌心。則為奔豚。水邪上逆。則為心

母。故曰

大逆也。

肺癰喘而不得臥。葶藶大棗瀉肺湯主之。

葶藶大棗瀉肺湯方

葶藶

熬令色黃。搗丸如彈子大。

大棗

十二枚

右先以水三升。煮棗取二升。去棗。內葶藶。取

一升。頓服。

此論內因之肺癰。而爲救治之法也。肺者。臟之  
蓋也。肺氣盛。則不得偃臥。肺實。故喘也。實則瀉  
之。葶藶。味辛苦。而性寒。辛走氣。苦主洩。寒清熱  
也。孟夏。葶藶死。此得陰氣而生。故交夏。卽死。是  
以能破洩其陽盛之邪。肺主氣。而癰爲陽氣有  
餘也。用大棗。補脾氣。以助金。緩中焦。而利竅。故  
用丸。而復煎。取其緩在中央。而上達於肺也。丸緩

黃者用甘草。蓋大黃洩腸胃。甘草。陽明胃經之藥也。緩葶藶者用大棗。葶藶瀉肺氣。棗爲經之果。益肺之母。而緩其中也。又大黃瀉血。葶藶瀉氣。陽明主經。足太陰主氣。欬而胸滿。振寒脈數。咽乾不渴。時出濁唾。腥臭。久吐膿如米粥者。爲肺癰。桔梗湯主之。

桔梗湯方

桔梗 一兩

甘草 二兩

右二味。以水三升。煮取一升。分溫再服。

又方 此方係宋人所增 並錄之以備用

桔梗

貝母

當歸

瓜瓣仁

枳殼

薏苡仁

桑白皮

百合 各五錢五分

五味子

葶藶

地骨皮

知母

甘草節

防己

黃耆

杏仁

各五分

清水煎服

此外因之肺癰而為救治之法也。欬而胸滿肺

從革作  
其臭腥

氣傷而脹滿也。邪熱甚故振寒而脈數。肺傷而  
不能通調水道。故咽乾熱不在經。故不渴也。水  
迫不利。故時出濁唾。肺內成癰。故腥臭也。久久  
脹成。則吐膿。肺潰。故如米粥也。蓋因邪舍於肺。  
榮衛不行而成癰。故宜苦梗以開提其肺氣。配  
甘草以解毒焉。

欬而上氣。此爲肺脹。其人喘目如脫狀。脈浮大者。  
越婢加半夏湯主之。

越婢加半夏湯方

麻黃

六兩

石膏

半斤

生薑

二兩

大棗

十五枚

甘草

二兩

半夏

半升

右六味。以水六升。先煮麻黃去上沫。內諸藥。煮取三升。分溫三服。

此因咳上氣而為肺脹也。夫欬喘上氣者。陽盛於上。而陰氣不能上交故也。陽盛於上則欬。欬則肺脹。肺脹則喘也。經云。陽盛則瞋目。陽盛於

陽明  
厥脫

上不得陰氣以和之。故目如脫狀也。浮則爲陽。大則爲氣脈浮大者。氣盛於上也。宜越婢湯發。越其陰土之氣。加半夏啓陰中之生氣上升。麻黃之地。冬不積雪。能通洩地氣於至陰之下。石膏色白味辛。陽明之宣品也。甘草黃中通理。薑棗培土宣通。地氣升而陰陽和。陽氣平而欬喘息矣。

肺脹欬而上氣。煩躁而喘。脈浮者。心下有水。小青

龍加石膏湯主之

小青龍加石膏湯

麻黃

芍藥

細辛

乾薑

甘草

桂枝

各三兩

五味子

半斤 半 夏 半

石膏

二兩

右九味。以水一斗。先煮麻黃減二升。去上沫。

內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。

此因肺脹而為欬。上氣也。夫肺主氣。而居高。腎

欬上氣  
而肺脹  
章肺脹  
欬上氣



爲生氣之原而居下。生氣不升則上下不交。肺氣虛而成脹矣。肺脹則欬而上氣矣。上下不交故煩躁。呼吸不利故喘也。脈浮者肺氣上浮則水邪反乘虛而上逆矣。宜小青龍湯啓太陽之氣以上升。而兼制水邪之妄逆。加石膏以助發陽明之土氣焉。夫腎爲水臟。受五臟之精而藏之。精盛而後氣生也。味子能資生五臟之精。而酸味濁厚。酸乃曲直之味。又能洩母之精氣上。

行。細辛。臭。香味辛。一莖直上。具東方甲木之體。能啓發水中之生陽。半夏。感一陰初生之氣。能大陰氣以上達。乾薑。溫中土之陽。麻黃。通裏陰之氣。芍藥。配甘草。化土氣以禦水邪。桂枝。保心王。防奔豚之上逆。平脈篇曰。腎氣微。少精血。奔氣促迫。上入胸膈。蓋精血少。則虛氣反上奔。精氣虛。則水邪反上逆。是以小青龍湯。乃啓發生陽之氣。而兼禦其水邪者也。上章。越婢湯。加青

龍之半夏。此章青龍湯加越婢之石膏。蓋助土以兼腎。助腎以兼土。水土生陽之氣。交相生旺者也。以上二章。復言肺痿肺癰之病。或從汗出。或從嘔吐。或從消渴。小便利數。或因妄下。傷其中下二焦。亡竭津液。以致熱在上焦。而爲咳。爲痰。爲癰。如中下二焦之津氣不升。則爲肺脹。而不成痿癰。蓋水土之氣。雖不能上升。而津液不亡。故爲痿。爲癰。爲脹。各有輕重淺深之分別也。

背脊論肺  
癰先因於  
癰此章之  
冷瀼即前  
章冷痿之  
所致

肺癰。胸滿脹。一身面目浮腫。鼻塞。清涕出不聞香  
臭。酸辛。欬逆上氣。喘鳴迫塞。葶藶大棗瀉肺湯主  
之。

此因肺氣虛冷而成癰也。肺主氣而主行榮衛  
陰陽。前章以肺中冷而成痿。久久則榮衛不行  
而成癰矣。經曰肺是動病則肺脹膨膨而喘。氣  
虛故一身面目浮腫也。肺氣虛則鼻塞不利少  
氣。肺中冷故鼻流清涕也。肺氣通於鼻。肺和則

前章因熱而成癰也  
蓋因於而成癰蓋  
清熱由氣血滯滯  
冷亦化熱故並宜  
解湯主之

鼻能知香臭。肺氣逆。故不聞香臭。酸辛也。臙真  
壅滯。是以喘鳴迫塞。故亦宜葶藶湯以瀉其肺  
之壅塞焉。按此證與前章肺癰喘而不臥。皆無  
濁唾腥臭。久久吐膿如米粥之證。蓋內因之癰。  
乃因肺氣壅滯。雖曰成癰。而無肺臙潰爛之候。  
故為可治。若外因之癰。多成不救者矣。首章雖  
曰吐膿血。此在臙外臙原之間。血積而成膿。  
非臙潰也。若先吐如米粥。此癰在肺臙。膿成則

肺爛矣。是以肺癰之有死有生。醫者所當審別者也。

奔豚氣病脈證第八

師曰。病有奔豚。有吐膿。有驚怖。有火邪。此四部病。皆從驚發得之。

此論奔豚之有因於驚發得之也。經曰。東方肝木其病發驚駭。蓋木者水之子也。子病發驚。母亦隨而上奔矣。傷寒厥陰篇曰。嘔家有癰膿者。

肝木能發  
洩母氣

辟下嘔吐

部乃有非  
之部分也  
證當在臟  
腑經絡上  
看

不可治嘔。膿盡自愈。下經嘔吐。章亦云。蓋肝病發驚。則水寒之邪。移於肝。而成癰膿也。水者土之畏也。木發驚。則陽明畏。而為驚怖矣。木者火之母也。母病則傳而為火邪矣。此因東方木病。發為驚駭。有及於腎臟。而為奔馳者。有病在本經。而吐膿者。有子於陽明。而為驚怖者。有傳於手厥陰胞絡。而為火邪者。故曰此四部病。皆為驚發行也。

部者有如所屬之部者。故當分作四部看。

師曰。奔。疝。病。從。少。腹。起。上。衝。咽。喉。發。作。欲。死。復。還。止。皆。從。驚。恐。得。之。

此復論奔脈之有因於驚恐得之也。驚則傷心。恐則傷腎。心腎水火之氣。互相交感者也。經言。腎氣微。少精血。奔氣促迫。上入胸膈。蓋驚傷心。則心氣虛矣。恐傷腎。則腎氣虛矣。心氣虛。則腎之虛氣。反乘虛而上奔。脈爲水畜。其性躁善奔。故從少腹起。上衝咽喉。蓋手足少陰之脈。循咽。



喉也。心為君主之官，而不受邪。水邪上凌，故發作欲死。邪復退歸，則病止也。夫上章之驚，因肝木病而發為驚駭，故病及於四部。此章之證，因驚恐而心腎得之，故止發為奔豚。當知奔豚之證有二因焉。七情所傷，驚在心肝。奔豚氣上衝胸，腹痛往來寒熱，奔豚湯主之。奔豚湯方

甘草

芫薺

當歸

各二兩

此治奔豚  
本病之劑  
後二方因  
心氣虛而  
水邪上逆  
傷心氣之  
劑也

半夏 四兩

黃芩 二兩

生葛 五兩

芍藥 二兩

生薑 四兩

甘李根白皮 一升

右九味以水二斗。煮取五升。溫服一升。日三。夜一服。

此總結二因之奔豚而為救治之方也。氣上衝胸者。奔氣迫促。上入胸膈也。腹痛往來寒熱者。驚發得之。肝木為病也。並宜奔豚湯主之。肝者。水之子也。肝主血。用歸芍藥以養其血。子能

令母實矣。肺者水之母也。黃芩清肺氣。母能制子之逆奔矣。五月半夏生。能助一陰之生氣。而又能夏大其火土。甘草有厚土之德。能止水邪之上奔。李乃肝之果。用肝木之根皮。以踈洩其母氣。生薑宣中焦之鬱。生葛通陽明之經。蓋肝木發病。則土氣受鬱。土氣宣通。則水畏而不敢奔逆矣。

發汗後。燒針令其汗。針處被寒。核起而赤者。必發

奔豚氣從少腹上至心。灸其核上各一壯。與桂枝加桂湯主之。

桂枝加枝湯方

桂枝 五兩  
去皮

芍藥 三兩

生薑 三兩

甘草 二兩

大棗 十二  
枚

右五味以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。

以下二章論傷寒之為奔豚也。夫腎為水臟。而主液。腎之液入心為血。血之液為汗。故曰心之

合脈證故

醫在經絡

石經

合脈也。其榮色也。其主腎也。發汗則傷其血液矣。復用燒針令其汗。是又傷其血脈矣。血脈受傷則心氣虛矣。更受其寒則寒凌心火。火氣外浮。故核起而赤也。心氣虛而外浮。更閉吸其經脈。則腎氣乘而上奔也。當灸其核上各一壯。以通洩其經氣。更與桂枝加桂湯散寒邪以輔心土。上章因驚駭發病。故用養血厚土之劑。此因寒凌心火。故二方並主於桂枝焉。

發汗後。臍下悸者。欲作奔豚。茯苓桂枝甘草大棗湯主之。

茯苓桂枝甘草湯方

茯苓 半斤

甘草 二兩

炙

大棗 十五枚

桂枝 四兩

甘瀾水者  
揚之無力

取其不助

水氣詳傷


藥論宗印

右四味。以甘瀾水一斗。先煮茯苓減二升。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

發汗。則虛其心液矣。臍下悸者。欲動作。而上奔

也。茯苓乃松靈潛伏於根下而生其味甘淡能保心靈而伐其水逆。桂枝輔心氣而兼散其水寒。甘草大棗厚土德以制水而更能通理其谿竅焉。

按松葉有兩氣五氣七氣。蓋地二生火而皮若龍鱗其花色黃而實如心骨其精化為青牛青羊青犬青人伏龜其壽皆千歲。夫牛犬為上畜羊為火畜龜則其為離也是松具木體而有火土相生之氣能補益火土之氣者也。茯苓乃餘氣歸伏於根所結故又能導火土之氣以下制其水邪。



醫論在胸  
現氣分上  
看故曰陽  
微知在上  
焦陰弦在  
陰脈上看  
如陰寒之  
脈上午胸  
中氣分則  
為胸痺如  
陰脈上乘  
于心則為  
心痛也

### 胸痺心痛短氣病脈

師曰。夫脈當取太過不及。陽微陰弦。卽胸痺而痛。所以然者。責其極虛也。今陽虛知在上焦。所以胸痺。心痛者。以其陰弦故也。

此論胸痺心痛短氣之病因在氣在脈也。故曰夫脈當取太過不及。謂當先審其脈之虛實也。陽微陰弦者。陽虛而陰寒也。卽胸痺而痛。所以然者。責其極虛也。極者。六極之所謂精極血極。



腎之中精  
 腎氣虛則  
 小寒之氣  
 既上逆於  
 機括萎蕤  
 自汗治  
 陽脈微乃  
 胸中之氣  
 虛恐悞認  
 在脈故復  
 曰知在上  
 焦心痛則  
 陰寒在脈  
 認爲病矣

也。蓋腎主藏精。腎之精入心化赤而爲血清血  
 極。故脈虛。陽生於陰。故陽徵陰弦也。經曰。所謂  
 胸痛少氣者。水氣在臟腑也。水者陰氣也。陰氣  
 在中。故胸痛少氣也。蓋腎爲水臟。而陽生於陰。  
 精陽氣虛。則陰寒之氣。反上逆於胸膈而爲痛  
 也。故曰。陽虛知在上焦。蓋言膻中之陽氣虛。而  
 陰弦上乘故也。夫心之合脈也。其主腎也。陰寒  
 之氣。上凌於心。則爲心痛。是以心痛引背。而取

經心  
引腰脊  
嘔取尼  
陰

足少陰也。

此章言水氣兼脈看。蓋脈下離平氣。氣不怒。子脈。是以篇中有病在氣者。

有病在脈者有病在氣而及於脈者。有病在脈而及於氣者。有脈氣之兼病者。如胸痺。乃病在胸中之氣。而又有因於脈心痛。乃陰寒在脈。而又有因於氣焉。

平人無寒熱短氣不足以息者實也。

此復申明陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其陰弦故也之義。夫胸中膻中也為氣之海。宗氣流於海中。上出喉嚨以司呼吸。然生氣之原。又在下焦。是以呼吸之氣上下出人而後和平。

如經脈實而下氣不通於上則短氣不足以息  
矣。平人無病之人也。辨脈篇曰陽脈不足陰氣  
上入陽中則洒淅惡寒陰脈不足陽氣下陷於  
陰中則發熱也。無寒熱者經脈實而不虛也。蓋  
言上焦胸中之陽氣虛陰寒之脈氣上乘於胸  
而爲胸痺。此病在胸中之無分也。如心痛者以  
其陰弦故也。蓋心主脈而發原於腎陰寒之氣  
循經上乘於心故爲心痛。其病在脈也。此論經

脈之實以證上章之虛。

血痺虛勞證云男子平人脈大為勞極虛亦為

勞故曰平人無寒熱者蓋言平人不因勞而極虛也短氣不足以息者實也之義當與首章息

搖肩者心中堅吸而微數其病在中焦實也二節合看

胸痛之病喘息欬唾胸背痛短氣寸口脈沉而遲

關上小緊數括萋薤白白酒湯主之。

括萋薤白白酒湯方

括萋實一枚

搗

薤白半升

白酒七升

右三味同煮取二升分溫再服。

經虛  
皆曰黃蒸

氣中爲氣  
薄後背而  
開胸  
生氣不升  
即脈遲遲  
則陽氣不

此論胸痺之病在氣也。首論陽微陰弦即胸痺而痛。蓋胸中之陽氣虛而陰弦之脈氣乘之則爲胸痺矣。經言腎氣微少精血奔氣促迫上入胸膈。蓋腎爲水臟而主藏精。精陽氣虛則水寒之氣反上逆於胸膈。故喘息欬唾病在膈上之膈中而胸背痛也。精極則生陽之氣不升故短氣而寸口脈沉而遲也。奔氣促迫上入胸膈故關上小緊也。括萋萋草能通經絡。萋實正圓色

其質腐  
潤下作酥  
體  
使中用而  
實山風沈

赤其形象心。而性油滑。主通心氣。以下交。而又能滑利水寒之邪。不上結也。薤味辛而臭腐。穰其莖中通直。上能通足少陰之生氣。以上升其性甚滑。雨露在上。卽滑下而不留。故古有薤露之歌。蓋取其通生陽上升。而滑水寒之下降也。白酒乃熟穀之液。主行中焦之氣焉。老酒主上行。白酒能行上而復行下。是以依白酒則多瀉。取其下行上而上行下。故用白酒也。  
胸痹不得臥。心痛徹背者。括婁蘆白半。夏湯主之。

栝蒌薤白半夏湯方

栝蒌實 一枚

薤白 三兩

半夏 半升

白酒 一斗

右四味同煮取四升溫服一升日三服

此論胸痹之兼病於脈也。夫胸中之陽氣虛而陰弦之脈氣乘之，卽爲胸背痛。陰寒之脈上乘於心，則爲心痛。胸痺心痛徹背者，氣脈皆病也。蓋陰弦之脈上乘於心，而胸中乃心主之宮城。

滋味苦臭  
發主逆心  
腎之氣

兩章論陰  
寒上乘而  
鬱胸痺此  
証章論上  
下不交而  
亦胸痺

胸中之陽氣微故為胸痺而心痛微背也。經脈發原於腎而主於心。生於中焦之陽明。脈病則胃不和故不得臥也。是以用栝蒌薤白以交通心腎之經氣。加半夏夏大其火土之氣以解中焦之痺逆焉。

胸痺心中痞留氣結在胸。胸滿脇下逆搶心。枳實薤白桂枝湯主之。人參湯亦主之。

枳實薤白桂枝湯方

八世張氏

卷六

六



錄上魚鮮  
 舞陽分而  
 錄煎者原  
 謂下也  
 復發急章  
 復論生陽  
 睡原本虛  
 寒故急用

枳實 四枚

厚朴 四兩

薤白 半升

桂枝 一兩

栝蒌 一枚

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去滓內諸藥煮數沸分溫三服

人參湯方

人參

甘草

白朮

乾薑

各二兩

右四味以水八升煮取三升溫服一升日三

報氣生於中土以水入升者  
取三升者陽生於陰也。

此論脈不交通而病及於氣也。胸痺胸中之氣病也。夫心主脈。心氣虛而不能下交於陰。故爲心中痞留也。氣之呼吸出入上下交通。經氣不通。則爲氣結。胸滿而病痺矣。胸中氣結。則下氣不能由中而上。反從子氣。以上乘。脇下乃厥陰經脈之所循。肝乃腎之子。心乃肝之子。故從脇下逆以捨心也。是以仍用栝蒌薤白以交心腎。

厥陰爲病  
氣上撞心

之氣用桂枝行心氣以解痞留加枳朴以疎中  
焦之脈。此通經以行氣也。夫血行脈中。氣行脈  
外。故雖有經氣之分。然膈中之宗氣積於胸中  
上出於肺。以司呼吸。而又與榮氣同行於十二  
經隧之中。是以氣虛則脈虛。而爲心中痞留。經  
氣不通。則胸中之氣亦結。而爲氣結胸滿。是胸  
中之氣與心腎上下之經脈。互相交通。須使者  
也。故人參湯亦主之者。補氣以資脈也。氣盛則

枳實通上  
湯交通上  
下之經氣  
也人參湯  
濕補中焦  
之虛氣也  
茯苓湯行  
降上焦之  
寒氣也橘  
枳湯宣通

經脈通而胸痺解矣

胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之橘枳

薑湯亦主之

茯苓杏仁甘草湯方

茯苓 三兩

杏仁 五十粒

甘草 一兩

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三

服

橘枳薑湯方

引魚之經  
 煎也益上  
 根不交則  
 爲屬理中  
 陰宜暢而  
 生下亦和  
 故曰亦和  
 經絡脈絡  
 以故上四  
 經脈氣分  
 降陽故非  
 引宜通

橘皮 一斤

枳實 三兩

生薑 半斤

右三味以水五升煮取二升分溫再服一斗

煮五

升五升煮二升溫服一升三服再服皆有微  
 意存焉夫天主氣而居上爲陽一乃奇陽五  
 爲上數一斗煮五升者取其天氣之降行於  
 中土也溫服一升日三服者一上而中中而  
 下取天氣下行故皆奇數也五升者中焦之  
 土數也三升再服者下焦之偶數也夫脈坐  
 於中焦陽明胃上而象法於陰故以五升者  
 二升日再服者取脈之生氣而行於陰脈中  
 也許學士曰熟讀仲景書得仲景法然法之  
 微妙隨處不有學者當悉心體會類而推之  
 幸勿以穿鑿見誦

橘逾淮北  
化而爲枳

此論氣塞而致經脈之不通也。夫短氣不足以息者，經脈實也。胸中氣塞，則經脈亦不交通。故吸人卽出而氣短也。茯苓主行心脾之氣以下降心，主陽而脾主氣也。杏子疎利肺金，肺爲氣之帥也。甘草和中通脈，此行氣以通經脈之劑也。橘枳一類，色黃臭香，中焦之宜品也。橘溫而枳涼，皆主宣通。橘上而枳下也。形皆圓，愈而臬胃白膜交錯，有若經脈連絡於皮肉之間，故主

通經脈而陽明之氣主經脈也。配生薑以宣陽  
明之氣。此通經絡以行氣塞故曰橘枳薑湯亦  
主之上章論虛故用人參湯以補中焦之氣。此  
章論實故用橘枳湯以疎中焦之經。夫經氣皆  
資生於中土。脾主肌腠而主氣。是以白朮乾薑  
補脾土之藥也。陽明主經脈而主榮。是以橘枳  
生薑疎通陽明之劑也。脾為至陰之濕土故宜  
乾薑配甘草以溫補胃  
主陽明之秋令故宜  
生薑之辛以宣通。

胸痺也  
 緩或急也  
 此因生氣  
 虛寒而或  
 升或微也  
 首章言陰  
 脈弦而成  
 胸痺此復  
 言陰氣寒  
 而成胸痺  
 也首章言  
 陰脈上乘  
 而為

胸痺緩急者。薏苡附子散主之。

薏苡附子散方

薏苡仁 十五兩  
 大附子 十枚

右二味。杵為散。服方寸匕。日三服。

此歸論氣之原於中下二焦也。夫氣發原於下  
 焦。先天之水中。生於後天水穀之精氣。流注於  
 胸中。游行於經脈。胸痺。胸中之氣病也。經曰。諸  
 急為寒。緩為脾病。緩者中焦之生氣弛也。急者



心痛下章  
得言氣逆  
附為心痛

密兩者主  
行氣五枚  
者利五脈

下焦之生原微弱而胸中寒急也故宜用附子

以固下焦之真元用薏苡以補中焦之生氣用

以為散者取其行散中下之生陽於上也薏苡米類

中焦之穀也脾破意故主補脾臟之神

心中痞諸逆心懸痛桂枝生薑枳實湯主之

桂枝生薑枳實湯方

桂枝

生薑

各三兩

枳實

五枚

右三味以水六升煮取三升分溫三服

水氣章以  
腎家曰諸  
寐心中痞  
留則胃氣  
亦逆胃氣  
不得上通  
于心故心  
懸痛也

食氣入胃  
濁氣歸心  
脈不上資  
亦若食氣  
之不歸心  
也

此論心痛之病在氣也。夫心腎之脈。上下交通。而心腎水火之氣。亦上下之相濟也。心中痞者。心氣逆於上也。上氣逆。則中下亦逆。上中下經氣並逆。故為諸逆也。夫脈發原於腎。而至於心。上下氣逆。脈亦不交通矣。心主孤懸於上。而不得陰脈之氣以和之。故心懸痛也。經曰。冬脈不及。則令人心懸如病飢。蓋腎脈不能上資。則心懸如病飢也。是宜桂枝行心氣以散痞。薑枳朮

上章論中  
焦之氣與  
上焦不和  
而心懸痛  
此章論下  
焦之生氣  
虛寒而心  
痛微背脊

中焦以通經。夫氣為陽，血脈為陰。然精虛則陽生而借轉者也。脈生於腎而主於心，胸中為陽氣之海。然陽氣生於水臟之精，而胸中之宗氣又行於脈內，是以本篇有病氣而因於經者，有病經而因於氣者。陰陽氣血分論之可合論之，亦可學。學者當潛心會悟，若膠柱以論陰陽，不可與言醫矣。

心痛微背脊痛微心烏頭赤石脂丸主之。

烏頭赤石脂丸方

烏頭一分  
赤石脂一兩  
蜀椒一兩

附子半兩  
乾薑一兩

心為陽而

之太陽生

陽之氣虛

寒故也

此歸結心

痛者以其

陰弦故也

而并立教

治之方

右五味。末之。蜜丸。如梧子大。先食服。一九日。

三服

此論心痛之在脈也。心痛者以其陰弦故也。蓋

陰寒之氣循經上乘寒凌心火。故心痛也。夫背

為陽心為陽中之太陽。心痛微背。背痛微心者。

陰極而陽剝矣。故宜烏頭赤石脂丸。主之。烏頭。

附子之母也。附子主溫下焦之生陽。烏乃太陽

之精。用烏頭一分。窠太陽之心氣以下合。石主

補腎石脂凝賦如脂味甘色赤有若腎臟所生  
之精血此蓋因極虛少精血而虛寒之氣反止  
入胸膈以凌心故用石脂補腎臟之精上入心  
化赤以資脈蜀椒保心氣以散陰寒乾薑溫中  
焦以助生氣故用九以留中俟烏頭引心氣以  
下交石脂助精血以上濟是以二藥為主方而  
命名也。

木解凡交  
通上下外  
內者皆用  
九

腹滿寒疝宿食病脈證第十

跌陽脈微弦法當腹滿不滿者必便難兩胫疼痛。此虛寒從下上也。以溫藥服之。

此論內因之腹滿。故脈候於跌陽也。跌陽在跗上五寸間。足陽明衝陽之動脈。動於足。跌故曰跌陽也。夫脈始於足少陰。腎生於足陽明。胃會於手太陰肺。是以本篇以跌陽候內因而以寸口候外因也。跌陽脈微弦者。中氣虛寒也。故法

當腹滿。不滿者。虛寒在下。故必便難。蓋中焦寒而不能主化。下焦虛而艱於決瀆也。腸下爲脘。不滿者。其因在腎。故兩脘疼痛也。夫元陽之氣。由少陰所生。上與陽明合化。此下焦之生氣衰微。以致中焦虛冷。是以內因之寒。從下而上。外因之寒。從外而內也。

病者腹滿。按之不痛。爲虛。痛者爲實。可下之。舌黃未下者。下之黃自去。

曰病者腹滿。承上文腹滿之爲病也。按之不痛。爲虛痛者爲實。蓋言內因之腹滿。而亦有虛實之分也。腹乃足太陰之分。脾家實腐穢當去。故可下之。中央黃色入通於脾。開竅於口。病在舌本。是以脾家實。則舌黃。舌黃未下者。下之黃自去。曰舌黃未下者。意言下之舌黃者。又當別論矣。

腹滿時減。復如故。此爲寒。當與溫藥。

此以腹滿時減。而審其虛寒也。夫外因之腹滿。



不減。減不足言。當下之。此爲熱也。內因之腹滿。時減復如故。此爲寒。當與溫藥。蓋內因之腹滿。多因中氣虛寒。然下焦之生陽未減。有時而升。則有時而減。然終屬虛寒。故復如故。而當與溫藥也。寒熱虛實。當於內因外因及時不二字中求之。

病者痿黃。躁而不渴。胸中寒實。而利不止者死。此虛寒之極。而成不救之證也。脾屬四肢。脾氣

並則陽氣  
故邪即  
人。樞  
此首論外  
因之腹滿  
皆緣表氣  
微虛由樞  
筋而後入

虛寒則四體不用而成痿黃矣。躁而不渴。惟陰  
無熱矣。胸中寒實。膈中之氣虛於上矣。利不止  
者。生氣之原脫於下矣。

寸口脈弦者。即脇下拘急而痛。其人齋齋惡寒也。  
此論外因之腹疾。故脈辨於寸口也。寸以候表。  
弦則為減。弦則為寒。寸口脈弦而即脇下拘痛  
者。蓋其人表氣微虛。不能外禦其邪。俾賊邪即  
下平于樞。而為脇下拘痛。表陽氣虛。故其人

論表

氣此章論

衛氣二氣

各有分別

詳傷寒論

宗印

衛氣盛名

曰章言衛

無章葦子

刺也

傷寒論曰

各氣內入

變而出之

奇奇惡寒也

此篇論外因之脈而蓋惡寒之邪入裏而後病起故首論云云

夫中寒家喜欠其人清涕出發熱色和者善嚏

此論衛氣虛於外而寒中於裏也平脈篇曰衛

氣虛者則惡寒數欠寒邪入於裏故其人清涕

出也若發熱者是衛氣復行於外衛氣盛故色

和也客氣內入陽氣外出邪不能容故嚏而出

之也經曰人之欠者衛氣晝日行於陽夜半則行於陰陰者主夜夜者臥陽者主上陰者

主下故陰氣積於下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠是以中寒家善欠者是

邪人於胃  
府爲肌中

衛氣行於陰。寒邪因而內入。陽引而上出。故善  
欠。非衛氣之虛也。是以知其發熱色邪而善噦。  
非若上章之陽氣虛於表者。即胸下拘痛而善  
嗇惡寒。下章之陽氣虛於裏者。下利不能噦也。  
中寒其人下利。以裏虛也。欲噦不能。此人肚中寒。

此復承上文而言。如中寒其人下利者。是陽氣

外內皆虛。非衛氣之行於陰也。裏氣虛寒。故其

人下利。無陽氣之上引。故欲噦不能。邪留於中。

故此人肚中寒也。上章論衛氣在內。此章論裏

裏虛。則表亦虛。故寒中於裏也。

下章論肌肉薄而表虛裏實。

夫瘦人繞臍痛。必有風冷。穀氣不行。而反下之。其氣必衝。不衝者。心下則痞也。

此論肌肉薄而邪中於裏也。夫陽氣者。游行於皮膚肌腠之間。邪之中人。始於皮毛。次於肌肉。邪正相搏。卽寒邪而亦能化熱。瘦人則肌肉薄。而陽氣無所舍矣。風則傷氣。瘦人繞臍痛者。無氣以外搏。致風邪直入於裏陰之分。而爲風冷也。脾爲陰中之至陰。而主腹。風邪干於陰土。故

反下之句  
借此以明  
裏氣不虛  
雖下之而  
氣仍衝逆  
腹滿之病  
邪在氣分  
不在經脈  
之血分故  
雖在腸胃  
而在腸胃  
之外故猶  
上冲而不  
下洩

為風冷而繞臍痛也。土氣傷而不能轉運。是以  
穀氣不行。若反下之。徒虛其腸胃。邪氣因而乘  
之。故其氣必衝。經曰。氣上衝胸。邪在大腸故也。  
不衝者。邪在於胃。客氣上逆。則心下痞也。傷寒論曰  
傷寒中風。醫反下之。其人下利。日數十行。穀不  
化。腹中雷鳴。心下痞鞭而滿。醫見心下痞。謂病  
不盡。復下之。其痞益甚。此非結熱。但以胃中虛  
客氣上逆。故使鞭也。此因瘦人肌膚薄而風邪  
入裏。然裏氣不虛。是以下之。而邪在大腸者。  
其氣上衝。胃虛而客氣上逆者。則心下痞也。  
病腹滿發熱。十日脈浮而數。飲食如故。厚朴七物

湯主之。

厚朴七物湯方

七物各有所主  
故名七物湯

厚朴 半斤

甘草 三兩

大黃 三兩

枳實 五枚

桂枝 二兩

生薑 五兩

大棗 十枚

右七味以水一斗。煮取四升。溫服八合。日三

服。嘔者加半夏五合。下利去大黃。寒多者加

生薑。

此邪入於腹而能外出者也。未表氣虛則邪入於裏。裏氣實則又能復出於外也。病腹滿者邪入於裏也。發熱者陽氣宣發而能爲熱於外也。十日一經已過而又當太陰主氣之時脈浮而數者邪隨氣而出於肌腠之間也。飲食如故者邪不涉經而不入胃腑也。厚朴七物湯主之。用小承氣之厚朴枳實大黃以洩在腹之實。用桂枝湯之桂枝甘草生薑大棗以散外出之邪。在



氣而不涉經故減去其芍藥。按足太陰之氣主肌腠。如邪同肌腠之外氣併入於內腹太陰之分者宜越婢湯發越脾氣使邪仍從外出而解。此外氣虛而邪自入於裏藉裏氣之攻發故止可外內分清。

腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐。附子粳米湯主之。

附子粳米湯方

附子炮一枚

粳米半升

半夏半升

甘草一兩

大棗十枚

本經章法  
首先論病  
因後復別  
聖治

右五味以水八升。煮米熟湯成去滓。溫服一升。日三服。

此內因之腹痛。而虛寒於下者也。夫一陽之氣。發原於下。上與陽明合化。而後生。此榮衛陰陽之氣。如生氣衰微。則中焦虛冷。而為腸鳴切痛。首章所謂虛寒從下上也。生陽潛伏。則寒水之氣。反上逆。而為胸脇逆滿嘔吐矣。用附子以溫復下焦之生陽。佐半夏助陰中之生氣上升。而

化大其土氣用粳米配甘草大棗以滋補其中

焦之氣焉。虛寒從下上故微補其中。

痛而閉者厚朴三物湯主之。

厚朴三物湯方

厚朴 八兩

大黃 四兩

枳實 五枚

右三味以水一斗二升先煮二味取五升內

大黃煮取三升溫服一升以利為度。此即小承氣湯

也。所謂承氣者熱氣在上寒氣乘之蓋以苦寒之藥承洩外來陽熱之邪此洩內因之實。

故更易

其名焉。

此承上文而言。內因之痛。有實證也。前章曰。病者腹滿。按之不痛。爲虛。痛者爲實。可下之。是論內因之虛實也。如但痛而閉塞。無雷鳴嘔逆之證者。此爲實也。厚朴三物湯主之。然此非外因之實熱。故止用小承氣湯以微洩之。

按之心下滿痛者。此爲實也。當下之。宜大柴胡湯。  
大柴胡湯方

柴胡 半斤

半夏 半斤

黃芩 三兩

芍藥 三兩

生薑 五兩

枳實 四枚

大棗 十二枚

右七味以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。

溫服一升。日三。

此論外因之邪。由形層次第而入於內者。為實也。夫瘦人中風。即入於腹。雖屬陽邪。亦為風冷。如邪從皮膚肌胸。而又入於腹胃者。雖寒邪而亦

用芍藥枳實以疎經者蓋氣分之邪入經而後能入腑入腑而後能下泄也

化爲實熱矣。按之心下滿痛者。此邪從胸膈而入於內膈之間。邪在內膈有形之分。故爲實也。當下之宜。大柴胡湯。此邪從外而內。故仍用小柴胡之柴胡半夏黃芩薑棗以解外入之邪。臟腑之經絡皆貫於膈。故加芍藥以疎經。配枳實以破洩。取其下故去其甘草人參。

腹滿不減。減不足言。當須下之。宜大承氣湯。

此外因之邪而內入於腹胃者。又宜大承氣以

下之也。夫外邪入內。必由外之胸膈。內之中膈。而下入於腹胃。如在外胸膈之間者。宜小柴胡湯以和解之。在內之中膈間者。宜大柴胡湯以。下之。在下之腹胃間者。宜大承氣湯洩之。此邪入之有次第。而湯劑之亦有淺深也。腹滿不減者。邪入於腹胃也。卽雖減。亦不足言其虛寒。當須下之。而愈宜大承氣湯。用大黃之苦寒。蕩滌其腸胃。芒硝之鹹冷。消解其熱邪。枳實苦洩。厚

朴破堅。此惡方之洩劑也。按此證乃寒傷陽明  
悍熱之氣。病氣而不病經。非腸胃實滿燥堅之  
比。本經引傷寒論中之此一條者。以明外因之  
腹滿。邪在空郭氣分之間。而不在經絡腸胃也。  
是以前章之腹滿發熱。而  
飲食如故。邪不在胃也。

心胸中大寒。痛嘔不能飲食。腹中寒。上衝皮起。出  
見有頭足。上下痛不可觸近。大建中湯主之。

大建中湯方



蜀椒

二合  
去汗

乾薑

四兩

人參

二兩

右三味。以水四升。煮取二升。去滓。內膠飴一

升。微火煎取一升半。分溫再服。如炊頃。可飲

粥二升。後更服。當一日食糜。溫覆之。

此論寒邪之在於中上二焦也。心胸中大寒。寒

邪填於胸膈之上也。上焦寒而不能主納。是以

痛嘔不能飲食也。腹者足太陰之分也。邪干太

陰之分。乃在臟腑之外。排腸胃而郭胸腹。腹中

難經曰肝  
之積如覆  
杯有頭足

寒上衝。是以皮起出見也。有頭足者。若積聚之  
有形也。痛者。陰之類也。陰毒在於皮膚之內。故  
痛而不可觸近也。宜大建中湯主之。蓋寒邪在  
於皮膚空郭之間。故當建立其中。勿使邪氣之  
干臟也。用乾薑人參膠怡大溫補其中。土蜀椒  
辛溫色赤圓小象心能輔心氣而散心胸中之  
大寒。且專精在皮。又能消皮膚中之陰聚。此主  
治上

中故曰大即大小  
青龍柴胡之義

腸胃止瀉  
腹瀉而內  
腸勝登二  
條蓋邪之  
大腹必由  
半瀉在腹  
始凍于太  
陰如留于  
腸則于及  
于厥陰矣  
是以太陰  
之腹滿宿  
食厥陰以  
陰之寒而  
藥為一章

腸下偏痛發熱其脈緊弦此寒也以溫藥下之宜

大黃附子湯。

大黃附子湯方。

大黃 三兩

附子 三枚

細辛 二兩

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強

人煮取二升半分溫三服服後如人行四五

里進一服。

此寒邪在於中下二焦也。腸下偏痛發熱其脈

緊屬少陰  
弦屬厥陰  
然皆寒脈

緊弦寒在厥陰少陰之分也。邪在下當從下解。然寒邪而在陰分。故又當以溫藥下之。附子溫少陰之寒。細辛達厥陰之氣。用大黃通洩其寒邪。此寒熱並施之妙用也。

寒氣厥逆。赤丸主之。

赤丸方

烏頭

二兩  
炮

茯苓

四兩

細辛

一兩

半夏

四兩  
洗

右四味末之。內真朱爲色。煉蜜爲丸。如麻子。大先食酒飲下三九。日再。夜一服。不知。稍增。

以知爲度

腹中溫  
爲知

此寒邪逆於上下二焦也。寒氣逆於上下。則陰陽之氣不相順接。是以厥逆而不知也。宜赤丸主之。烏乃日中之魄。烏頭辛熱。雄烈能助君火之氣。以祛上逆之寒。佐以茯苓。導心氣以下降也。細辛辛溫香竄。能啟發陰中之生陽。以散下

逆之寒氣佐以半夏助陰中陽氣以上升。水銀乃陰中之真汞。火煨而成朱。有坎離相生之義。故用以爲丸。以待上下陰陽之順接也。以上三章論寒邪之直中於裏而有上中下之分焉。

腹痛。脈弦而緊。弦則衛氣不行。卽惡寒。緊則不欲食。邪正相搏。卽爲寒疝。遶臍痛。若發則白汗出。手足厥冷。其脈沉弦者。大烏頭煎主之。

大烏頭煎方

烏頭

大者五枚熬  
去皮不咬咀

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令  
水氣盡取二升強人服七合弱人服五合不  
差明日更服不可日再服。

此論寒疝之先病是動而後及於經也。弦則爲  
減。緊則爲寒。陽減則衛氣不行於外而卽惡寒。  
緊則爲寒而不欲食也。氣分之寒邪與經榮之  
正氣相搏。卽爲寒疝。心臟主脈。臟腑相連。其痛

經脈別論  
曰其虛痛  
心厥氣留  
澀發爲白

必下。故遶臍也。若發則寒邪上逆。逼其君火上  
炎。肺乃心之蓋。火氣上乘。則汗出於肺。故曰白  
汗出也。手足受氣於胸中。寒氣上入於胸。故手  
足厥冷也。其脈沉弦者。寒入於經也。宜大烏頭  
煎。主之用烏頭不咬咀者。取其象心。心主脈也。  
助心主之氣以退寒邪也。用五枚者。利五脈也。  
烏頭辛熱走氣。用蜜煎而後能入經。蓋脈資生  
於中焦之胃腑。是以甘走經而辛走氣也。按脈



要精微論曰。脰得心脈而急。此爲何病。病形何如。岐伯曰。病名心疝。少腹當有形也。帝曰。何以言之。岐伯曰。心爲牡臟。小腸爲之使。故曰。少腹

當有形也。

故此證俗名主心疝。蓋心主脈而寒邪入於經也。又名小腸疝。臟腑經絡

之相連也。是以寒邪下行則爲遠疝。之小腸寒邪上逆則爲主心之厥冷。是以主心有死證者。

寒凌心火之太甚也。

寒疝腹中痛及脇痛裏急者。當歸生薑羊肉湯主之。

膏歸生薑羊肉湯方

當歸 三兩

生薑 五兩

羊肉 一斤

右三味以水八升。煮取三升。溫服七合。日三服。若寒多者。加生薑成一斤。痛多而嘔者。加橘皮二兩。白朮一兩。加生薑者。亦加水五升。煮取三升。二合服之。

此寒邪迫於衝脈厥陰而爲疝也。衝脈爲十二經絡之海。並足少陰之經。挾臍上行。蓋衝脈爲

傷寒熱入

血室刺肝

經之期門

裏陰者

之經也

蓋諸脈出

於形身

惟諸脈獨

行於腹裏

經血之原。肝主諸經之血。是以衝脈為病。而及於厥陰之經也。寒疝腹痛者。寒邪在腹也。及脇痛裏急者。迫於厥陰衝脈之經也。二經皆主血。故宜用當歸以養血。脈生於中焦。故用生薑以宜通血。生於精。故用血肉之味。以補其精焉。寒疝腹中痛。逆冷。手足不仁。若身疼痛。灸刺諸藥不能治。抵當烏頭桂枝主之。

抵當烏頭桂枝湯方

烏頭

右一味。以蜜二斤。煎減半。去滓。以桂枝湯五合解之。得一升後。初服二合。不知。卽服三合。又不知。復加至五合。其知者。如醉狀。得吐者。爲中病。

此氣分之寒邪。而迫於任脈之爲病也。夫氣爲陽。任脈統任一身之陰。陽邪盛。則迫及於陰矣。任脈起於中極之下。少腹之內。寒疝腹中痛者。

任脈為病  
男子內結  
七疝

用氣藥入  
經以抵當  
氣分之邪  
故醫所不  
知也  
烏頭煎  
生薑行  
氣之藥

任脈之為病也。氣受寒邪。故逆冷。氣傷。則衛氣有所凝而不行。故其肉有不仁也。若身疼痛者。此邪尚在於肌腠。氣分之間。迫於所生為病。邪不在經。故非灸刺之所能愈也。邪雖在氣。又非氣藥之所宜。故云。諸藥不能治。宜抵當烏頭湯主之。所謂抵當者。溫養經脈。以抵當氣分之邪也。故用大烏頭煎以溫經。合桂枝湯以散氣。按病之病。其病雖在經。其邪尚在氣。故所用之藥。雖溫經亦行氣。

桂脈遍天  
癸至任脈  
瀆天癸竭

川而乃二  
字者以數  
繁弦分作  
三處看也

再按內經云。腎脈大急沉。肝脈大急沉。皆為疝。  
心脈搏滑急為心疝。肺脈沉搏為肺疝。三陽急  
為癢。三陰急為疝。是寒邪搏於陰脈。皆能為疝。  
然衝脈為十二經脈之原。任脈總任一身之血  
脈。二脈又挾足三陰之脈。循腹上行。是以所病  
在腹者。獨責於衝任。治其根原。即股疝亦解。經  
云。三陽結為癢。而時俗又有勝  
膀胱者。亦衝任之起於膀胱也。

其脈數而緊。乃弦狀如弓弦。按之不移。脈數弦者。  
當下其寒。脈緊大而遲者。必心下堅。脈大而緊者。  
陽中有陰也。可下之。

此總結上文而言。氣分之寒邪入於經也。夫寒

經脈受邪  
則入于府

經曰諸急  
爲寒脈雖  
往來數急  
其體居然  
不移故復

疝之病。病雖在胸腹內之陰脈。然寒邪尚在氣分。是以所用之藥。皆溫經以散氣。如邪已入於經。是不能溫散。而止可從乎下解矣。故復論其脈焉。其脈數而緊。乃弦者。數爲在腑。緊則名陰。弦則爲寒。蓋言寒疝之病。寒邪已入於經者。而有是脈也。狀如弓弦。按之不移者。謂脈雖數而緊。其脈體按之不移。卽往來頻數。而仍爲寒脈也。邪在經脈。當入於腑。脈數弦者。寒邪在腑。當

曰狀如月  
逆  
減緊大脈  
大而緊皆  
實體認分  
別緊大者  
淨之緊也  
大而緊者  
按之緊也  
分陰陽故  
中用而字

下其寒。夫胸膈之上。乃心主之宮城。膈中之氣。分邪在膈上。其脈則大。緊則為陰。遲則為寒。脈緊大而遲者。此寒邪在膈上之陰脈。故必心下堅也。夫心肺居上為陽。肝腎居下為陰。邪在膈上。感胸中之陽。其脈則大。邪在膈下。感陰分之陰。其脈則緊。脈大而緊者。邪在內膈上下之間。故為陽中有陰。可從下解。下之則膈上之邪亦從而下矣。蓋經脈貫膈。上下相通。非氣分之比。



邪在膈下之經脈。則將入於腑。故曰可下之。傷  
寒論可下章曰。脈雙弦而遲者。必心下鞭。脈大  
而緊者。陽中有陰也。可以下之。卽與此章同義。  
脈按之不移者。脈之體也。數緊者。脈之象也。謂  
雖往來之數急。而脈體居然不移。是雖數而非  
熱脈也。陽明篇曰。脈緊則愈。此邪欲外出。而脈  
見緊象。是緊又可名陽脈矣。脈之微勢。雖在脞  
視。惟心  
印之。

問曰。人病有宿食。何以別之。師曰。寸口脈浮而大。  
按之反濇。尺中亦微而濇。故知有宿食。大承氣湯

主之。

此論宿食留中而阻碍其經氣也。經曰：穀入於胃，脈道乃行。水入於經，而血乃成。經脈榮衛之氣，皆由水穀之所資生。故胃者，五臟之本也。臟氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣。乃至於手太陰也。寸口脈浮而大，按之反濇者，寸以候外，按以候裏。此脈之根氣有所阻碍，故按之反濇也。尺以候裏，是以尺中亦微而濇，故知有宿

食留中以致蹇塞而不通暢。乃大承氣湯之所

主也。

經脈之所生自尺而關寸由沉而中浮寸。且主外主氣氣雖浮大於外而根本不通。

是以按之滑

而尺中微。

脈數而滑者實也。此有宿食。下之愈。宜大承氣湯。

數爲在腑。滑則流利如珠。此爲實也。蓋有宿食

在腑。有諸中而形諸脈也。下之則愈。宜大承氣

湯。

傷寒論可下章曰下利脈反滑當有所去。下之乃愈。宜大承氣湯。蓋上章之寸尺微滑者。

乃宿食留中以致阻滯。經氣是大承氣所主之證也。此章之數而滑者。宿食欲去不能。故流利。

而滑。是以下之則愈。宜大承氣湯。故本經凡曰某湯主之。宜某湯。可與某湯。下之愈。可下之。當下之。急下之。皆有分別。學者俱宜潛心體會者。

下利不飲食者。有宿食也。當下之。宜大承氣湯。

此論宿食之證也。止曰下利不飲食。是無外內之邪矣。夫腸胃受盛水穀。傳化物而不藏。故實而不滿。下利則腸胃空虛。而反不飲食者。有宿食也。夫受穀者濁。受氣者清。清者注陰。濁者注陽。清者上注於肺。濁者下走於胃。胃之清氣上

出於口肺之濁氣下注於經清氣在下則生痰  
泄濁氣在上則生脹滿宿食留中則上下清濁  
不分矣清氣不升是以下利濁氣不降故不欲  
食也當下之使中焦和而升降行清濁分而下  
利止矣

上章以脈辨宿食此章以飲食辨宿食  
之證蓋脈與飲食皆陽明胃腑之所主

也。

宿食在上脘當吐之宜瓜蒂散。

瓜蒂散方

瓜蒂

一分

赤小豆

一分

右二味各別搗篩爲散已合治之取一錢七以香豉一合用熟湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之

胃爲中焦水穀之海。有上脘中脘下脘之分。中焦在胃中脘不上不下。至腐化水穀。食在上脘。是未入於中。而不得腐化。故成宿食。在上者是

苦爲陰劑  
 爲陽酸爲  
 陰赤爲陽  
 沉爲陰浮  
 爲陽皆取  
 其陰而變  
 陽者也

當因而越之也。經曰。酸苦鹹湧洩爲陰。獨取灰  
 滯之苦。黑豆之鹹。赤小豆之酸者。蓋灰屬蔓草。  
 性惟上延。直至稍秒。生極苦之蒂。而吐結極甜  
 之灰。豆爲水穀。性陰而沉。一取其性沉而蒸浮。  
 一取其味陰而色赤。皆從下而上。自陰而陽。一  
 惟上湧而不下洩者也。以上四章。論內因之宿  
 食。所謂榮任之邪。從口入也。  
 脈緊如轉索無常者。有宿食也。

此論外因之邪。而成宿食也。止言脈而不言證者。是無外之寒證。內之陰證矣。蓋因宿食留中。胃腑內實。陽明氣盛。脈欲出而不能。故如蛇之紆迴而欲出。卽如陽明篇之所謂此水不勝穀氣。與汗共併。脈緊則愈之。大意相符也。以下二章。止言宿食而不言下者。蓋外因之食。有當下者。有緩下者。有不可妄下者。篇載傷寒論中。是以本經不言下也。

脈緊。頭痛風寒。腹中有宿食不化也。



脈緊者。承上文之轉索無常也。夫緊爲陰寒之脈。頭痛之風寒。陽證也。以陽證而見緊脈。當知此非風寒之病脈。乃腹中有宿食不化故也。此篇論腹滿之在氣。寒疝之在經。宿食之在腑。病因脈證。各有不同。而病皆在腹。是以彙爲一章。使後學之便於審別也。

風中五臟  
六腑之俞  
即為臟腑  
之風  
于臟必死  
故皆不立  
方

五臟風寒積聚病脈證第十一

肺中風者口燥而喘身運而重。胃而腫脹。

此論五臟為風寒所中。非病三陰三陽之六氣。亦非皮膚肌絡之形層。蓋緣俞氣化薄。而邪直中於臟也。夫邪風之至。疾如風雨。感則害人五臟。治五臟者。半死半生。是以後列真臟之死脈也。夫飲入於胃。上輸於脾。通調於肺。肺傷而不能通調水液。故口燥也。大氣積於胸中。命曰氣

風為陽邪  
故中風則  
百燥寒熱  
陰邪故中

海。出於肺。以司呼吸。肺氣傷而呼吸不利。故喘也。臟真高於肺。五行榮衛陰陽者也。榮衛陰陽不行。故身運而重。血虛則胃氣虛。則腫脹也。日經  
風之傷人也。或為寒熱。或為熱中。或為寒中。或為厲風。或為偏枯。或內至五臟六腑。其病各異。其名不同。此乃五臟風寒。  
非寒熱偏枯之中風也。

肺中寒。唾濁涕。

肺氣通於鼻。肺受寒邪。則鼻竅不通矣。肺主涕。脾主涎。肺氣不能通調於下。開發於上。是以涎

夫則濁涕  
今如傷風  
而濁涕者  
邪在皮毛  
書中臟也

涕皆從唾而出矣。

人胃水穀之液。上輸于脾。故經言足太陰獨受其濁。脾氣

散精。上歸於肺。肺氣通調。下輸膀胱。今鼻之涕。脾之涎。皆從脾竅而出。故曰濁涕也。

肺死臟。浮之虛。按之弱如葱葉。下無根者死。

肺死臟者。肺死而真臟之脈見也。浮之虛者。如

羽毛之中人膚也。按之弱如葱葉者。虛大而空。

非若榆莢之厭厭聶聶也。臟氣者。必藉胃氣而

至於手太陰。下無根者。胃氣絕也。

五臟。虎獨肺。臟曰下無根。

蓋肺主周身之氣。而氣發原於腎。故曰腎為本。肺為末。下無根者。根氣絕於下也。此解亦通。姑

兩存之以

備參考

肝中風者。頭目暈。兩脇痛。行常偃。令人嗜甘。

肝中風而頭目暈者。風淫掉眩也。風氣通於肝。邪合於經。故兩脇痛也。風客淫氣。精乃亡。邪傷肝也。肝主筋而主血。精血亡。則筋脈縮。故行常偃也。風木之邪。賊傷中土。故令人嗜甘也。

肝中寒者。兩臂不舉。舌本燥。喜太息。胸中痛。不得轉側。食則吐。而汗出也。

如垂下不舉上為舉如垂下不起者是痿也非不舉也  
本經凡病皆皆涉于筋也  
筋也

經曰。手屈而不伸者。其病在筋。肝主筋。寒凝則筋縮。故兩臂不舉也。膽主筋。故於肝。肝臟筋膜之氣也。筋者。聚於陰器。而脈絡於舌本。肝主血。血液不津。故舌本燥也。經言膽病者。善太息。膽氣欲升。肝病寒而膽氣不舒。故善太息而伸出之。肝所生病者。胸滿。肝受寒。故胸中痛。膽氣逆。故不得轉側也。食氣入胃。散精於肝。淫氣於筋。肝病而不得淫散其精氣。故食則吐。而水穀之津

液。亦反從肌。腠皮毛而出也。

肝。死臟。浮之弱。按之如索不來。或曲如蛇行者死。東方肝脈。微弦需弱而長。浮之弱。無長竿末稍之象矣。如索如蛇。與弦長需弱之相反。蓋肝臟死而失其本體之脈也。

肝着。其人常欲蹈其胸上。先未苦時。但欲飲熱。旋覆花湯主之。

旋覆花湯方

旋覆花

三兩

葱 十四莖

新絳 少許

右三味。以水三升。煮取一升。頓服。

肝主疎洩。木欲上達。肝着者。肝留着而不得疎  
達之爲病也。蹈者。古之按摩法也。期門者。肝之  
募。在胸上之兩乳間。欲蹈其胸上者。欲疎其經  
氣。而木鬱得以達之也。先未苦欲蹈其胸上時。  
但欲飲熱者。熱乃火性。欲從子以洩母也。旋覆  
花。一名金沸草。肺金之藥也。肺屬乾金。而主天。



故有旋轉覆下之義。旋運金氣以制鬱着之木。制則生化矣。葱色青而中通莖直。其東方肝木之象。能助木氣以上達也。蠶食桑而成絲。三者皆白金之象也。用紅花以染絳。紅花膏汁有如肝臟所藏之血。用新絳者。亦欲制化其肝血以行之也。臟真留着。故用制化之法。是以後章腎着。用補中焦。

心中風者。翁翁發熱。不能起。心中饑。食卽嘔吐。

翁翁動起。合聚之貌。風淫則火動。故翁翁發熱。

也。心者神志之所藏也。夫生之來謂之精，兩精相搏謂之神，所以任物者謂之心。心有所應謂之意，意之所存謂之志。故經言榮衛調，志意和，則筋骨強健，神志病，故不能起也。感火熱之氣，故心中饑，不能淫精於脈，故食即嘔吐也。

心中寒者，其人苦病，心如噉蒜狀。劇者心痛徹背，背痛徹心，譬如蠱注，其脈浮者，自吐乃愈。

寒凌心火，則火鬱矣，心如噉蒜狀者，心氣鬱於

上有若懊膿之難忍也。背爲陽。心爲陽中之太陽。心痛徹背。背痛徹心者。寒迫之劇也。如蠱者。陽剛居上。陰寒居下。雖蠱注而不致於太壞也。蓋心主無爲而不受邪。相火用事。爲寒所折。火鬱發之。自吐乃愈。蠱元亨而復治矣。

心傷者。其人勞倦。卽頭面赤而下重。心中痛而自煩。發熱。當臍跳。其脈弦。此爲心臟傷所致也。

此復論心傷之脈證也。夫心主無爲而不受邪。

藏德神不  
外出不止  
水火時交

交者正氣  
奔者邪水

雖寒邪凌薄。如盤注而不致於大壞。若至心傷。是不免於心死。臟脈之見矣。夫臟者藏也。藏德不止者也。心藏神而主火。上下水火之氣相交。斯成既濟之無咎。其人勞倦。卽頭面赤而下重者。蓋煩勞則張。心火不藏。而反上炎。故卽頭面赤。水不上交。而惟下。故下重。水火不濟。故心中痛。而自煩也。火惟外熖。故發熱。水邪乘虛而欲上奔。故當臍跳也。在心主脈。弦則爲寒。其脈弦。

者。真火外出。而真臟寒矣。

心死。臟浮之實如麻豆。按之益躁疾者死。

夫心者。神明之官。運用而藏德者也。故南方之脈。洪大而來盛去悠。火之空象也。若浮之實如麻豆者。心臟之形。反見於外矣。按之益躁疾者。火位已虛。水氣乘之矣。

邪哭。使魂魄不安者。血氣少也。血氣少者。屬於心。心氣虛者。其人則畏。合目欲眠。夢遠行而精神

散。魂魄妄行。陰氣衰者爲癲。陽氣衰者爲狂。

此論血氣衰而爲心病也。臟真通於心。心藏血脈之氣也。血氣衰。則神失其養矣。夫生之來。謂之精。兩精相搏。謂之神。隨神往來。謂之魂。並精而出。謂之魄。所以任物。謂之心。是魂魄並隨神氣而往來出入者也。心爲心主之官。而主笑。反邪哭者。血氣少也。血氣少。則神失其養。故使魂魄不安矣。是以虛者。其人則畏。合目。目合。則神

陰陽者心  
臟之陰陽  
也常知能  
往背居心  
氣虛之為  
病與陽明  
之實得不  
也

魂游蕩而不能收攝矣。血氣少而神志虛故欲

眠。神魂不能守舍故妄行而離散也。陰氣衰者

為癲。陽氣衰者為狂。陰病癲而陽病狂也。難經云。真

陰則癲。重陽則狂。蓋陰氣虛而邪併之則癲。陽

氣虛而邪併之則狂。本經論虛難經論實也。辨

脈篇曰。未知何臟陰陽先絕。若陽氣前絕。陰氣

後竭者。其人死。身色必青。陰氣前絕。陽氣後竭

者。其人死。身色必赤。是臟

雖屬陰而有陰氣。陽氣也。

脾中風者。翕翕發熱。形如醉人。腹中煩重。皮目爛

爛而短氣。

此中脾風  
故與中風  
不同

夫風動而土靜。風陽而土陰。故其熱有合聚動  
起之象。非若病氣之卽爲發熱也。形如醉人者。  
地氣冒明也。腹中。太陰脾土之分。風邪擾而煩。  
土氣鬱而重也。脾氣主肌肉。脾土之精。爲目之  
約束。風氣淫動。故皮日癢癢也。邪客於土。則中  
焦實。中焦實。則上下呼吸之氣不通。而短氣不  
足以息矣。

按宋林億等奏疏畧云。計五臟各中風寒。今脾  
則載中風。腎風寒俱失載。去古既遠。無文可以



游氣在下  
 有清濕之  
 邪起于下  
 也  
 天之六淫  
 陽人六氣  
 入無分子  
 上下矣

補穀也。予思此經分門別類，又非斷簡殘編矣。夫此三節，竊有疑焉。予嘗終夜不寢，靜而思之，少有應見，備列於左，以俟後賢參攷。夫木火土金水，火地之陰陽也。風寒暑濕燥火，天之陰陽也。在地成形，在天成氣。人秉天地之氣而生，有形無形，咸所具載。有形者，五臟六腑是也。無形者，臟腑三陰三陽之氣也。是以天之六淫傷人，六氣而不病，臟腑之有形也。此章之所謂臟腑風寒，積聚者，中臟腑之有形也。是以與內經之凡傷於寒，則為病熱，與風論之五臟中風，各不同也。又與傷寒論之傷寒中風，亦不同也。靈樞經云：邪氣在上，清氣在下。本經云：清邪居上，濁邪居下。風寒二氣者，天之清邪也。故至中在上之臟，水土二臟居下，當主受濕濁之邪。肝乃東方乙木，其脈又與督脈會於巔，故主受天之清氣。風乃木邪，故主剋脾土。水土在下，故不受天之

清邪也。是以臟死之脈證。亦乃有形之臟死。與諸經之臟神臟氣所死之脈證。亦不同也。

脾死。臍浮之大堅。按之如覆杯。澀澀狀如淫者死。脾爲孤臟。中央土。以灌四旁。故其脈柔。和相離。如浮之大堅。臍真見於外矣。按之如覆杯。土氣死於內矣。潔潔。清靜貌。澀澀狀如淫者。土氣死而水得以清靜自然。相乘侮矣。

跌陽脈浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。浮濇相搏。大便則堅。其脾爲約。麻子人丸主之。

麻子入丸方

麻仁 二兩

芍藥 半斤

枳實 半斤

大黃 一斤

厚朴 一斤

杏仁 一斤去皮尖另研細

石六味為末。煉蜜為丸。如梧桐子大。飲服十丸。漸加。以知為度。

此論脾約之為病也。胃為陽土。脾為陰土。浮為陽脈。瀯為陰脈。跌陽以候脾胃者也。跌陽脈浮。胃氣強也。跌陽脈瀯。脾氣弱也。蓋舉以候浮。按

飲食入胃  
精氣上溢  
脾如胃  
氣獨強則  
與脾陰相  
絕脾不得  
胃之精液  
則窮約矣  
津液不上  
輪而惟下  
是則小便  
數而大便  
堅矣

以候瀆也。脾臟寒瀆。而不能約束水津。則小便頻數矣。小便數而精液不能還入胃中。則大便堅矣。此因脾臟之束縛約瀆。以致水液之下亡也。麻仁丸主之。麻仁補中潤燥。芍藥苦洩養陰。枳朴破敦阜之氣。大黃滌燥熱之堅。佐杏子以利肺金。實則瀉其子也。按約者。有束縛之意。若留着不疎。蓋肝腎脾三臟居下而主陰。故有約着之病。湯方曰。以知為度。蓋脾主腹。脾臟約束而木通。俟腹中溫為也。

金匱要略

卷之

第

腎着之病。其人身體重。展中冷。如坐水中。形如水  
狀。反不渴。小便自利。飲食如故。病屬下焦。身勞汗  
出。衣裏冷濕。久久得之。腰以下冷痛。腹重如帶五  
千錢。甘薑苓朮湯主之。

甘薑苓朮湯方

甘草

白朮

各二兩

乾薑

茯苓

各四兩

右四味。以水五升。煮取三升。去滓。分溫三服。

腰卽溫。

此論下焦病而致腎着也。經云。下焦如瀆。蓋行  
水用之不息者也。下焦病則水臟之令不行。而  
病着矣。故其人身體重。腰中冷。如坐水中。形如  
水狀也。水令不行。則津液不能上資而爲渴。反  
不渴而小便自利。飲食如故者。病屬下焦。而不  
涉於中上二焦也。夫水穀入口。其味有五。津液  
各走其道。故三焦出氣。以溫肌肉。充皮膚。爲其

濕氣五陰  
數五原以  
下者陰  
也

津入胃水穀之津自能走於上焦故不渴也上  
焦氣化而霧露降故小便自利中焦氣化而水  
穀消故飲食如故也身勞則陽氣張而汗出此  
下焦寒水之液漸漬滲洩於衣裏冷濕也久久  
而復受冷濕之氣反傷肌表之陽下焦病而不  
能溫充皮肉以致腰下冷痛腹重如帶五手錢  
也。是宜甘薑苓木湯溫補中焦之土氣以制化  
其水臟焉。是以肝着病用旋覆  
花湯以運補肺金。

原始于腎  
自下而上  
搏而不退  
皆從下入  
凡中則則  
邪轉矣

腎死臟。浮之堅。按之亂如轉丸。益下入尺中者死。  
沉石而更腎之本脈也。浮之堅。臟真出於外矣。  
按之亂如轉丸。腎欲絕於裏矣。益入尺中。水從  
下而絕也。此臟死之脈。與五臟之神氣。臟氣死  
脈不同。蓋仲祖著金匱玉函。以補諸經之未盡  
也。

問曰。三焦竭部。上焦竭。善噫。何謂也。師曰。上焦受  
中焦氣。朱和。不能消穀。故能噫耳。下焦竭。卽遺溺。



失便其氣不和。不能自禁制。不須治。久則愈。

此論五臟六腑。由三焦之氣。遊行而衛護者也。首章曰。腠者。是三焦通會元真之處。爲血氣所注。理者是皮膚臟腑之文理。不遺形體有衰痛。則無由入其腠理。若五臟元真通暢。人卽安和。是以三焦不和。卽爲噫。爲遺。如三焦虛竭。則風寒直中于臟腑矣。上焦出於胃上口。並咽以上。貫膈。而布胸中。走液。循太陰之分而行。還至陽。

明上至舌。下足陽明。常與榮俱行於陽二十五度。行陰亦二十五度。中焦亦並胃中。出上焦之後。此所受氣者。泌糟粕。蒸津液。化其精微。上注於肺脈。乃化而爲血。以奉生身。莫貴於此。故獨行於經隧。命曰榮氣。下焦者。別迴腸。注於膀胱。而滲入焉。故水穀者。常并居於胃中。成糟粕而俱下於大腸。而成下焦。滲而俱下。濟泌別汁。循下焦而滲入膀胱焉。是三焦之氣相通。而上下

平脈篇曰  
三焦不歸

其部蓋三  
焦乃無形

之氣而各  
歸有形之

部者

目字宜休  
會

二焦並受中焦水穀之氣者也。三焦各有部者。三焦竭部者。三焦之氣。虛竭於本部也。上焦受中焦氣。中上之氣未和。不能消穀。蓋上焦主陽。中焦又得上焦之陽而主化也。穀氣不消。則胃氣厥逆。欲從上散而為噫耳。下焦氣竭。則不能約束二陰。即為遺溺失便。蓋其氣與中焦不和。下焦之氣。不得受氣於中焦。故自不能禁制於二便也。此言三焦之氣。並受氣於中。而下焦之

病。因與中焦不和。自不能禁。以明上章腎着。乃下焦之自病也。故曰不須治。久則自和而自愈矣。

師曰。熱在上焦者。因欬爲肺痿。熱在中焦者。則爲堅。熱在下焦者。則尿血。亦令淋閉不通。大腸有寒者。多鶩溏。有熱者。便腸垢。小腸有寒者。其人下重便血。有熱者必痔。

此復論三焦之本氣寒熱。而能致病於臟腑也。

上焦者  
 心之無形  
 故先言上  
 中焦者  
 脾胃熱各  
 歸其部又  
 有陰陽之  
 故後言  
 下焦者  
 寒

夫三焦者。元陽之氣也。然三焦各歸其部。在上  
 者為陽。在下者為陰。在中者為陰陽之間。是以  
 在上為熱。在下有熱有寒也。熱在上焦者。因欬  
 為肺痿。熱在中焦者。則為陽明燥堅。熱在下焦  
 者。則熱迫膀胱而尿血。或為淋閉不通也。鶩瀆  
 者。如鴨之尿。一遺即已。稍遲復遺。不堅鞭也。腸  
 疝者。滯下而為痢也。小腸為赤腸。心之府也。屬  
 手太陽。太陽多血少氣。寒在小腸。則陽氣傷。而

下重。陰絡傷而便血。熱在小腸。則腸澀而爲痔也。蓋大小腸膀胱。並屬於下焦。故也。此言三焦之氣。通會元真於腠理。溫肌肉。充皮膚。而使臟腑安和。如三焦不和。卽爲噫。爲遺。三焦寒熱。則爲淋。爲痿。是臟腑之病。皆緣於三焦。而臟腑之風寒積聚。亦由陽氣衰微。命氣化薄。而使邪之直中于陰也。

問曰。病有積。有聚。有滯。氣。何謂也。師曰。積者。臟病

也。終不移。聚者。腑病也。發作有時。展轉痛移。為可  
治。滯氣者。脇下痛。按之則愈。復發為滯氣。諸積大  
法。脈來細而附骨者。乃積也。寸口積在胸中。微出  
寸口。積在喉中。關上。積在臍傍。上關上。積在心下。  
微下關。積在少腹。尺中。積在氣衝。脈出左。積在左。  
脈出右。積在右。脈兩出。積在中央。各以其部處之。  
此論臟腑受邪。邪留於臟腑之外。募原絡脈之  
間。而不干臟腑者。為積。為聚也。經云。積皆生於

風雨寒暑。清濕喜怒。喜怒不節。則傷臟。臟傷。則病起於陰。陰既虛矣。則風雨襲陰之虛。病起於上。而生積。清濕襲陰之虛。病起於下。而成積。夫虛邪中人。始於皮膚。皮膚緩。則腠理開。開則邪從毛髮入。入則抵深。深則毛髮立。毛髮立。則淅然。故皮膚痛。留而不去。傳舍於絡脈。則痛於肌肉。其痛之時。息大經乃代。傳舍于經。則漉淅。喜驚。傳舍於輪。則六經不通。四肢則肢節痛。腰脊



不一其處  
以上論天  
之生積

卒然多食  
概則腸滿

乃強傳舍於伏衝之脈。則體重身痛。傳舍於腸胃。則資響腹脹。多寒則腸鳴。餐泄。食不化。多熱則澹出糜。傳舍于腸胃之外。募原之間。留着於脈。積留而不去。息而成積。不一其處。積之始生。得寒乃生。厥乃成積也。厥氣生足悒。足悒在脛寒。脛寒則血脈凝滯。血脈凝滯則寒氣上入於腸胃。入於腸胃則臍脹。臍脹則腸外之汁沫。迫聚不得散。日以成積。卒然多食飲。則腸滿。起居

是又兼滯  
氣而成積

而積成矣  
以上論地  
之成積

此復言外  
因內傷而  
成積故曰  
皆成

不節。用力過度。則絡脈傷。陽絡傷。則血外溢。血  
外溢。則衄血。陰絡傷。則血內溢。血內溢。則便血。  
腸胃之脈傷。則血溢於腸外。腸外有寒。汁沫與  
血相搏。則併合凝聚不得散。而積成矣。卒然外  
中於寒。若內傷於憂怒。則氣上逆。則六輸不通。  
溫氣不行。凝結蘊裏而不散。津液瀦滲。着而不  
去。而積皆成矣。故積爲五臟之所生。陰氣也。多  
裏大膿血。在肌肉之裏。腸胃之外。膜原六腑之

間發有常處。其痛不離其部。在左曰肝積。名肥。氣發左脇下。如覆杯。有頭足。在右曰肺積。名息。膏發右脇下。覆大如杯。在上曰心積。名伏梁。起臍上。大如臂。上至心下。在下曰腎積。名奔豚。發少腹上。至心下。若豚狀。或上或下。在中曰脾積。名痞氣。在胃脘。覆大如杯。此臟積之形名也。至於積在喉中。積在氣衝。此又越於五積之外者也。聚者陽氣也。陽浮而動。六腑之所成。假氣而

血氣食三  
者皆能成  
積故彙爲  
一章  
食積于內  
則禁氣在  
膈膈氣不  
通故食積  
也

作發作有時。展轉痛移。無有定着。邪在膈之陽。故爲可治者也。禁氣者。糜飪之邪。禍從口入。所謂食積是也。蓋食氣入胃。散津於肝。滯氣於筋。肝虛而不能行。散穀精之氣以養筋脈。故膈下痛。按之則氣散而愈。復發則又聚而爲禁氣矣。諸積之脈。無論上下陰陽。大法脈來細而附骨者。乃積也。蓋血積。故脈細。病陰臟之氣。故細而附骨也。寸以候上。關以候中。尺以候下。左脈候

兩在地為  
 水為濕在  
 天為寒  
 邪在外而  
 不干臟故  
 曰襲  
 天生地成  
 故曰生積  
 成積

左。右脈候右。脈兩出者。以候中央。積屬陰而屬  
 血。故以脈候。聚屬氣而聚散無常。故不言脈也。  
 夫邪干臟者。為臟腑風寒之死證。不干臟而在  
 臟之外。募原絡脈之間者。為積病。蓋總屬臟痛。  
 但有干臟不干臟之分。故彙為一算。以分別之。  
 經言風雨襲陰之虛。病起于上而生積。清濕襲  
 陰之虛。病起于下而成積。是五臟各受風寒清  
 濕之邪。而有上下之分矣。是以水土二臟受地  
 清濕之邪。而不受天之風寒清氣也。故脾臟無  
 中寒。而腎臟無中風。中寒也。清濕之邪。襲於臟  
 外。則為積。干臟亦為死證。故有邪死。臟風。積死  
 臟脈也。此論當與前  
 合看。以釋林億之疑。